

## Cálculo de derivadas

Versión: 9 de septiembre de 2016

## B.1 Derivadas de las funciones elementales

La derivada de las funciones elementales se calcula recurriendo directamente a la definición, como en los siguientes ejemplos, aunque en algunos casos los límites indeterminados que aparecen pueden ser complicados de calcular.

## Ejemplo B.1

Derivada de una función constante  $f(x) = k$ 

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

## Ejemplo B.2

Derivada de  $f(x) = x^2$ 

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

## Ejemplo B.3

Derivada de  $f(x) = \sqrt{x}$ 

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

## B.2 Álgebra de derivadas

Conocidas las derivadas de las funciones elementales, un conjunto de propiedades conocidas como **álgebra de derivadas**, permiten calcular la derivada de otras funciones construidas combinando aquellas mediante operaciones aritméticas y composición de funciones.

## ÁLGEBRA DE DERIVADAS

$f(x) = g(x) \pm h(x)$	$f'(x) = g'(x) \pm h'(x)$
$f(x) = g(x) \cdot h(x)$	$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$
$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$	$f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{h(x)^2}$ , si $h(x) \neq 0$ .
$f(x) = g(h(x))$	$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$ (Regla de la CADENA)

## TABLA DE DERIVADAS DE LAS FUNCIONES ELEMENTALES

Funciones elementales		Funciones compuestas (usando la Regla de la Cadena)	
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$		
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$		
$f(x) = ax$	$f'(x) = a$	$f(x) = ag(x)$	$f'(x) = ag'(x)$
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$	$f(x) = ag(x) + b$	$f'(x) = ag'(x)$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$	$f(x) = g(x)^2$	$f'(x) = 2g(x)g'(x)$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$f(x) = \sqrt{g(x)}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} g'(x)$
$f(x) = x^n$ ( $n \neq 0$ )	$f'(x) = nx^{n-1}$	$f(x) = g(x)^n$	$f'(x) = ng(x)^{n-1} g'(x)$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$f(x) = e^{g(x)}$	$f'(x) = e^{g(x)} g'(x)$
$f(x) = a^x$ ( $a > 0$ )	$f'(x) = a^x \ln(a)$	$f(x) = a^{g(x)}$	$f'(x) = a^{g(x)} \ln(a) g'(x)$
$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f(x) = \ln(g(x))$	$f'(x) = \frac{1}{g(x)} g'(x)$
$f(x) = \log_b(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x \ln(b)}$	$f(x) = \log_b(g(x))$	$f'(x) = \frac{1}{g(x) \ln(b)} g'(x)$
$f(x) = \text{sen}(x)$	$f'(x) = \text{cos}(x)$	$f(x) = \text{sen}(g(x))$	$f'(x) = \text{cos}(g(x)) g'(x)$
$f(x) = \text{cos}(x)$	$f'(x) = -\text{sen}(x)$	$f(x) = \text{cos}(g(x))$	$f'(x) = -\text{sen}(g(x)) g'(x)$
$f(x) = \text{tan}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\text{cos}^2(x)}$	$f(x) = \text{tan}(g(x))$	$f'(x) = \frac{1}{\text{cos}^2(g(x))} g'(x)$
$f(x) = \text{arc sen}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \text{arc sen}(g(x))$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}} g'(x)$
$f(x) = \text{arc cos}(x)$	$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \text{arc cos}(g(x))$	$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-g(x)^2}} g'(x)$
$f(x) = \text{arctan}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$f(x) = \text{arctan}(g(x))$	$f'(x) = \frac{1}{1+g(x)^2} g'(x)$

### B.3 Ejemplos de cálculo de derivadas

#### Ejemplo B.4

**Derivada de**  $f(x) = (5x^3 + 2)^4$

Aplicando la fórmula de derivación de la potencia de una función,  $g(x)^n$ , se tiene

$$f'(x) = 4(5x^3 + 2)^3 \cdot (5 \cdot 3 \cdot x^2) = 60(5x^3 + 2)^3 x^2$$

#### Ejemplo B.5

**Derivada de**  $f(x) = \sqrt{7 - x^3}$

Aplicando la fórmula de derivación de la raíz cuadrada de una función,  $\sqrt{g(x)}$ , se tiene

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{7 - x^3}} \cdot (-3x^2) = \frac{-3x^2}{2\sqrt{7 - x^3}}$$

#### Ejemplo B.6

**Derivada de**  $f(x) = e^{3x^2}$

Hay que aplicar la derivada de la exponencial de una función,  $e^{g(x)}$ ,

$$f'(x) = e^{3x^2} (3 \cdot 2 \cdot x) = 6x e^{3x^2}$$

#### Ejemplo B.7

**Derivada de**  $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + 2}$

Aplicando la fórmula de derivación de un cociente:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 2) - (x^3 - 1)2x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{(3x^4 + 6x^2) - (2x^4 - 2x)}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x^4 + 6x^2 + 2x}{(x^2 + 2)^2}$$

#### Ejemplo B.8

**Derivada de**  $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{x+4}{x-1}\right)$

Hay que aplicar en primer lugar la fórmula de derivación del seno de una función,  $\operatorname{sen}(g(x))$ , y después la de la derivada de un cociente:

$$f'(x) = \cos\left(\frac{x+4}{x-1}\right) \left(\frac{(x-1) - (x+4)}{(x-1)^2}\right) = \frac{-5}{(x-1)^2} \cos\left(\frac{x+4}{x-1}\right)$$

#### Ejemplo B.9

**Derivada de**  $f(x) = x\sqrt{x^2 - 3}$

Hay que aplicar la derivada de un producto y la derivada de la raíz cuadrada de una función:

$$f'(x) = \sqrt{x^2 - 3} + x \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 3}}(2x) = \sqrt{x^2 - 3} + \frac{x^2 \sqrt{x^2 - 3}}{(x^2 - 3)} = \sqrt{x^2 - 3} \left(1 + \frac{x^2}{x^2 - 3}\right)$$

**Ejemplo B.10**Derivada de  $f(x) = \sqrt[3]{\ln(x^2 + 1)}$ 

Hay que escribir la raíz como una potencia de exponente fraccionario,  $f(x) = (\ln(x^2 + 1))^{1/3}$ , y aplicar la fórmula de derivación de  $g(x)^n$  y luego la del logaritmo:

$$f'(x) = \frac{1}{3} (\ln(x^2 + 1))^{-2/3} \frac{1}{x^2 + 1} (2x) = \frac{2x}{3(x^2 + 1)\sqrt[3]{\ln^2(x^2 + 1)}}$$

**Ejemplo B.11**Derivada de  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 

Hay que aplicar la regla de derivación de un cociente de dos funciones:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x}{x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$$

**Ejemplo B.12**Derivada de  $f(x) = \arctg(\sqrt{x^2 + 1})$ 

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (\sqrt{x^2 + 1})^2} \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} 2x = \frac{1}{x^2 + 2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

**Ejemplo B.13**Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de ecuación  $y = x^2 + 3x - 1$  en el punto  $x = 2$ .

La ecuación de la recta tangente a la curva  $y = f(x)$  en el punto  $x = a$  viene dada por

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

En este caso,  $f(x) = x^2 + 3x - 1$  y su derivada es  $f'(x) = 2x + 3$

Sus valores en  $x = 2$  son  $f(2) = 4 + 6 - 1 = 9$  y  $f'(2) = 4 + 3 = 7$

Luego la ecuación de la tangente es:

$$y = 9 + 7(x - 2)$$

**Ejemplo B.14**

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de ecuación  $y = \ln(x^2 + 3)$  en el punto  $x = 1$ .

La ecuación de la recta tangente a la curva  $y = f(x)$  en el punto  $x = a$  viene dada por

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

En este caso,  $f(x) = \ln(x^2 + 3)$  y su derivada es  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$

Sus valores en  $x = 1$  son  $f(1) = \ln(1 + 3) = \ln(4)$  y  $f'(1) = \frac{2}{1 + 3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Luego la ecuación de la tangente es:

$$y = \ln(4) + \frac{1}{2}(x - 1)$$

**Ejemplo B.15**

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de ecuación  $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$  en el punto  $x = 1$ .

La ecuación de la recta tangente a la curva  $y = f(x)$  en el punto  $x = a$  viene dada por

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

En este caso,  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$  y su derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) = \frac{-1}{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)x^2} = \frac{-1}{x^2 + 1}$$

Sus valores en  $x = 1$  son  $f(1) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$  y  $f'(1) = \frac{-1}{1 + 1} = -\frac{1}{2}$

Luego la ecuación de la tangente es:

$$y = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}(x - 1)$$

**B.4 Derivada de la función inversa**

Para calcular la derivada de la función inversa, se usa la regla de la cadena: Observamos que  $f$  y su inversa  $f^{-1}$  (caso de existir), vienen relacionadas por

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad \forall x \in \text{Dominio}(f^{-1})$$

Derivando en los dos miembros de esta igualdad y utilizando la Regla de la Cadena para derivar el primer miembro se tiene

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1, \quad \forall x \in \text{Dominio}(f^{-1})$$

y por lo tanto

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \forall x \in \text{Dominio}(f^{-1})$$

**Ejemplo B.16**

Calcular la derivada de la función  $f(x) = \ln(x)$  utilizando la derivada de la función inversa.

Derivando en la identidad  $e^{\ln(x)} = x$  se tiene

$$e^{\ln(x)} \cdot \frac{d}{dx}(\ln(x)) = 1 \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$$

como es bien sabido.

**Ejemplo B.17**

Calcular la derivada de la función  $f(x) = \arcsen(x)$  utilizando la derivada de la función inversa.

Derivando en la identidad  $\sen(\arcsen(x)) = x$  se tiene  $\cos(\arcsen(x)) \cdot \frac{d}{dx}(\arcsen(x)) = 1$  de donde, despejando,

$$\frac{d}{dx}(\arcsen(x)) = \frac{1}{\cos(\arcsen(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sen^2(\arcsen(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

## B.5 Derivada logarítmica

En ocasiones, resulta cómodo derivar el logaritmo de una función para calcular su derivada. Según la regla de la cadena, si  $f$  es derivable en  $x$  y  $f(x) > 0$ ,

$$\frac{d}{dx} \ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

y de aquí se puede despejar  $f'(x)$ .

**Ejemplo B.18**

Utilizar la derivación logarítmica para calcular la derivada de la función  $f(x) = a^x$ .

Tomando logaritmos en ambos miembros se tiene

$$\ln(f(x)) = \ln(a^x) = x \ln(a)$$

y derivando ahora:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(a) \Rightarrow f'(x) = \ln(a) f(x) = \ln(a) a^x$$

**Ejemplo B.19**

Utilizando la derivación logarítmica, deducir la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones.

Sea  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ . Tomando logaritmos se tiene  $\ln h(x) = \ln f(x) + \ln g(x)$ .

Derivando en ambos miembros:

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)},$$

de donde, despejando ahora  $h'(x)$ :

$$h'(x) = \left( \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} \right) h(x) = \left( \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} \right) f(x)g(x) = \left( \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} \right) f(x)g(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

**Ejemplo B.20**

Calcular la derivada de la función  $f(x) = (\operatorname{sen}(x))^{\cos(x)}$ .

Tomando logaritmos en ambos miembros se tiene

$$\ln(f(x)) = \ln\left((\operatorname{sen}(x))^{\cos(x)}\right) = \cos(x) \ln \operatorname{sen}(x)$$

y derivando ahora:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\operatorname{sen}(x) \ln \operatorname{sen}(x) + \cos(x) \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} = -\operatorname{sen}(x) \ln \operatorname{sen}(x) + \frac{\cos^2(x)}{\operatorname{sen}(x)}$$

de donde

$$f'(x) = \left(-\operatorname{sen}(x) \ln(\operatorname{sen}(x)) + \frac{\cos^2(x)}{\operatorname{sen}(x)}\right) (\operatorname{sen}(x))^{\cos(x)}$$

**Ejemplo B.21**

Calcular la derivada de la función  $f(x) = (x^2 + 1)^{2x-3}$ .

Tomando logaritmos en ambos miembros se tiene  $\ln f(x) = (2x - 3) \ln(x^2 + 1)$  y derivando ahora:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2 \ln(x^2 + 1) + (2x - 3) \frac{2x}{x^2 + 1}$$

de donde

$$f'(x) = \left(2 \ln(x^2 + 1) + \frac{2x(2x - 3)}{x^2 + 1}\right) f(x) = \left(2 \ln(x^2 + 1) + \frac{2x(2x - 3)}{x^2 + 1}\right) (x^2 + 1)^{2x-3}$$

## B.6 Derivación implícita

En ocasiones la relación entre dos variables no viene expresada explícitamente, es decir, con una de ellas “despejada”, como en  $y = x \ln(x^2 + 1)$ , sino que viene dada mediante una relación entre ambas (una ecuación), como en  $x^2y + y^3 = 1$ . Se dice en estos casos que  $y$  viene **implícitamente definida** por dicha ecuación.

Sin embargo, es posible, utilizando la Regla de la Cadena, derivar con respecto de  $x$  directamente en la ecuación. Para ello se deriva con respecto de  $x$  en ambos miembros de la ecuación, teniendo en cuenta que  $y$  es una función de  $x$ :  $y = y(x)$ .

Por ejemplo, en la ecuación anterior  $x^2y + y^3 = 1$  se tendría

$$\begin{aligned} x^2y + y^3 = 1 &\Rightarrow \frac{d}{dx}(x^2y + y^3) = \frac{d}{dx}(1) = 0 \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(x^2y) + \frac{d}{dx}(y^3) &= (2xy + x^2y') + (3y^2y') = 0 \end{aligned}$$

Agrupando los términos que contienen  $y'$  y despejando se tiene:

$$2xy + x^2y' + 3y^2y' = 2xy + (x^2 + 3y^2)y' = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{-2xy}{x^2 + 3y^2}$$

Es decir: en un punto  $(x, y)$  que verifique la ecuación  $x^2y + y^3 = 1$ , la derivada de  $y$  con respecto de  $x$  es  $y' = \frac{-2xy}{x^2 + 3y^2}$ .

**Ejemplo B.22**


Derivar implícitamente en el ecuación  $x \ln(y^2 + 1) + y = 1$  y despejar la derivada de  $y$  con respecto de  $x$ .

$$\begin{aligned}x \ln(y^2 + 1) + y = 1 &\Rightarrow \frac{d}{dx} (x \ln(y^2 + 1) + y) = \frac{d}{dx} (x \ln(y^2 + 1)) + \frac{d}{dx} (y) = 0 \\ \Leftrightarrow \ln(y^2 + 1) + x \cdot \frac{d}{dx} (\ln(y^2 + 1)) + \frac{d}{dx} y &= \ln(y^2 + 1) + x \left( \frac{2yy'}{y^2 + 1} \right) + y' = 0 \\ \Leftrightarrow \ln(y^2 + 1) + \left( \frac{2xy}{y^2 + 1} + 1 \right) y' &= \ln(y^2 + 1) + \left( \frac{2xy + y^2 + 1}{y^2 + 1} \right) y' = 0 \\ \Leftrightarrow y' &= \frac{-\ln(y^2 + 1)}{\frac{2xy + y^2 + 1}{y^2 + 1}} = \frac{-(y^2 + 1) \ln(y^2 + 1)}{2xy + y^2 + 1}\end{aligned}$$



**Ejemplo B.23**

Los puntos del plano que verifican la ecuación  $x^2y + xy^2 = 3$  forman una curva con varias ramas. El punto  $(1, 1.3028)$  pertenece a una de ellas. Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en dicho punto.



Calculamos, implícitamente, la derivada de  $y$  con respecto de  $x$ :

$$x^2y + xy^2 = 3 \Rightarrow 2xy + x^2y' + y^2 + x \cdot 2yy' = 0 \Leftrightarrow (2xy + y^2) + (x^2 + 2xy)y' = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{-(2xy + y^2)}{2xy + x^2}$$

Sustituyendo ahora  $(x, y) = (1, 1.3028)$  obtendremos la derivada de  $y$  con respecto a  $x$  en dicho punto, es decir, la pendiente de la recta tangente en dicho punto:

$$y' = \frac{-(2xy + y^2)}{2xy + x^2} \Big|_{x=1, y=1.3028} = \frac{-(2 \times 1.3028 + (1.3028)^2)}{2 \times 1.3028 + 1} \approx -1.1934$$

Escribimos ahora la ecuación de la recta que pasa por el punto  $(1, 1.3028)$  con pendiente  $p = -1.1934$ :

$$y = 1.3028 - 1.1934(x - 1) = -1.1934x + 2.4962$$

**B.7 Ejercicios**

Calcular las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \sqrt{3 - x^2}$
2.  $f(x) = \ln(x^2 - x + 1)$
3.  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) \operatorname{sen}(x)$
4.  $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$
5.  $f(x) = e^{-x^2+3}$

6.  $f(x) = \operatorname{sen}^2\left(\frac{x+2}{x+1}\right)$

7.  $f(x) = \operatorname{sen}(1-x) \cos^3(x)$

8.  $f(x) = \sqrt{\cos^3(x^2)}$

9.  $f(x) = \sqrt{1 - \cos(x^3)}$

10.  $f(x) = \sqrt[3]{\operatorname{sen}^2(5x)}$

11.  $f(x) = e^{\operatorname{sen}(x^2)}$

12.  $f(x) = \frac{e^x}{1 - e^x}$

13.  $f(x) = e^{\frac{1+x}{1-x}}$

14.  $f(x) = e^{\operatorname{tg}(x^2)}$

15.  $f(x) = e^{\sqrt{1-x^2}}$

16.  $f(x) = 2^{x^3-3x^2}$

17.  $f(x) = 5^x x^5$

18.  $f(x) = 2^x(x^2 + x)$

19.  $f(x) = 3^{\sqrt{1-x}}$

20.  $f(x) = \cos(2^{x+1})$

## Soluciones de los ejercicios

1.  $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{3-x^2}}$

2.  $f'(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1}$

3.  $f'(x) = -\frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{2} \operatorname{sen} x + \cos \frac{x}{2} \cos x$

4.  $f'(x) = \frac{-1}{2x^2} \sqrt{\frac{x}{1-x}}$

5.  $f'(x) = -2x e^{-x^2+3}$

6.  $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} \operatorname{sen} \left( \frac{x+2}{x+1} \right) \cos \left( \frac{x+2}{x+1} \right)$

7.  $f'(x) = -\cos(1-x) \cos^3(x) - 3 \operatorname{sen}(1-x) \operatorname{sen}(x) \cos^2(x)$

8.  $f'(x) = \frac{-3x \cos(x^2) \operatorname{sen}(x^2)}{\sqrt{\cos(x^2)}}$

9.  $f'(x) = \frac{3x^2 \operatorname{sen}(x^3)}{2\sqrt{1-\cos(x^3)}}$

10.  $f'(x) = \frac{10}{3} \frac{\cos(5x)}{\sqrt[3]{\operatorname{sen}(5x)}}$

11.  $f'(x) = 2x \cos(x^2) e^{\operatorname{sen}(x^2)}$

12.  $f'(x) = \frac{e^x}{(1-e^x)^2}$

13.  $f'(x) = \frac{2}{(1-x)^2} e^{\frac{1+x}{1-x}}$

14.  $f'(x) = 2x \frac{1}{\cos^2(x^2)} e^{\operatorname{tg}(x^2)}$

15.  $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} e^{\sqrt{1-x^2}}$

16.  $f'(x) = \ln(2) (3x^2 - 6x) 2^{x^3-3x^2}$

17.  $f'(x) = 5^x x^4 (x \ln(5) + 5)$

18.  $f'(x) = 2^x ((x^2 + x) \ln(2) + 2x + 1)$

19.  $f'(x) = \frac{-\ln(3) 3^{\sqrt{1-x}}}{2\sqrt{1-x}}$

20.  $f'(x) = -\ln(2) 2^{x+1} \operatorname{sen}(2^{x+1})$