

Neyfa Khalisha Amaluna (23030130014)

Kalkulus dengan EMT

Materi Kalkulus mencakup di antaranya:

- Fungsi (fungsi aljabar, trigonometri, eksponensial, logaritma, komposisi fungsi)
- Limit Fungsi,
- Turunan Fungsi,
- Integral Tak Tentu,
- Integral Tentu dan Aplikasinya,
- Barisan dan Deret (kekonvergenan barisan dan deret).

EMT (bersama Maxima) dapat digunakan untuk melakukan semua perhitungan di dalam kalkulus, baik secara numerik maupun analitik (eksak).

Mendefinisikan Fungsi

Terdapat beberapa cara mendefinisikan fungsi pada EMT, yakni:

- Menggunakan format `nama_fungsi := rumus fungsi` (untuk fungsi numerik),
- Menggunakan format `nama_fungsi &= rumus fungsi` (untuk fungsi simbolik, namun dapat dihitung secara numerik),
- Menggunakan format `nama_fungsi &&= rumus fungsi` (untuk fungsi simbolik murni, tidak dapat dihitung langsung),
- Fungsi sebagai program EMT.

Setiap format harus diawali dengan perintah `function` (bukan sebagai ekspresi).

Berikut adalah beberapa contoh cara mendefinisikan fungsi:

$$f(x) = 2x^2 + e^{\sin(x)}.$$

```
>function f(x) := 2*x^2+exp(sin(x)) // fungsi numerik
>f(0), f(1), f(pi)
```

```
1
4.31977682472
20.7392088022
```

```
>f(a) // tidak dapat dihitung nilainya
```

```
Variable or function a not found.
Error in:
f(a) // tidak dapat dihitung nilainya ...
^
```

Silakan Anda plot kurva fungsi di atas!

Berikutnya kita definisikan fungsi:

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x}}{x + 1}$$

```
>function g(x) := sqrt(x^2-3*x)/(x+1)
>g(3)
```

```
0
```

```
>g(0)
```

```
0
```

```
>g(1) // kompleks, tidak dapat dihitung oleh fungsi numerik
```

```
Floating point error!
Error in sqrt
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
g:
  useglobal; return sqrt(x^2-3*x)/(x+1)
Error in:
g(1) // kompleks, tidak dapat dihitung oleh fungsi numerik ...
^
```

Silakan Anda plot kurva fungsi di atas!

```
>f(g(5)) // komposisi fungsi
```

```
2.20920171961
```

```
>g(f(5))
```

0.950898070639

```
>function h(x) := f(g(x)) // definisi komposisi fungsi
>h(5) // sama dengan f(g(5))
```

2.20920171961

Silakan Anda plot kurva fungsi komposisi fungsi f dan g:

dan

bersama-sama kurva fungsi f dan g dalam satu bidang koordinat.

```
>f(0:10) // nilai-nilai f(0), f(1), f(2), ..., f(10)
```

```
[1, 4.31978, 10.4826, 19.1516, 32.4692, 50.3833, 72.7562,
99.929, 130.69, 163.51, 200.58]
```

```
>fmap(0:10) // sama dengan f(0:10), berlaku untuk semua fungsi
```

```
[1, 4.31978, 10.4826, 19.1516, 32.4692, 50.3833, 72.7562,
99.929, 130.69, 163.51, 200.58]
```

```
>gmap(200:210)
```

```
[0.987534, 0.987596, 0.987657, 0.987718, 0.987778, 0.987837, 0.987896, 0.987954, 0.988012, 0.988071, 0.988129, 0.988187, 0.988245, 0.988303, 0.988361, 0.988419, 0.988477, 0.988535, 0.988593, 0.988651, 0.988709, 0.988767, 0.988825, 0.988883, 0.988941, 0.988999, 0.989057, 0.989115, 0.989173, 0.989231, 0.989289, 0.989347, 0.989405, 0.989463, 0.989521, 0.989579, 0.989637, 0.989695, 0.989753, 0.989811, 0.989869, 0.989927, 0.989985, 0.990043, 0.990101, 0.990159, 0.990217, 0.990275, 0.990333, 0.990391, 0.990449, 0.990507, 0.990565, 0.990623, 0.990681, 0.990739, 0.990797, 0.990855, 0.990913, 0.990971, 0.991029, 0.991087, 0.991145, 0.991203, 0.991261, 0.991319, 0.991377, 0.991435, 0.991493, 0.991551, 0.991609, 0.991667, 0.991725, 0.991783, 0.991841, 0.991899, 0.991957, 0.992015, 0.992073, 0.992131, 0.992189, 0.992247, 0.992305, 0.992363, 0.992421, 0.992479, 0.992537, 0.992595, 0.992653, 0.992711, 0.992769, 0.992827, 0.992885, 0.992943, 0.992999, 0.993057, 0.993115, 0.993173, 0.993231, 0.993289, 0.993347, 0.993405, 0.993463, 0.993521, 0.993579, 0.993637, 0.993695, 0.993753, 0.993811, 0.993869, 0.993927, 0.993985, 0.994043, 0.994101, 0.994159, 0.994217, 0.994275, 0.994333, 0.994391, 0.994449, 0.994507, 0.994565, 0.994623, 0.994681, 0.994739, 0.994797, 0.994855, 0.994913, 0.994971, 0.995029, 0.995087, 0.995145, 0.995203, 0.995261, 0.995319, 0.995377, 0.995435, 0.995493, 0.995551, 0.995609, 0.995667, 0.995725, 0.995783, 0.995841, 0.995899, 0.995957, 0.996015, 0.996073, 0.996131, 0.996189, 0.996247, 0.996305, 0.996363, 0.996421, 0.996479, 0.996537, 0.996595, 0.996653, 0.996711, 0.996769, 0.996827, 0.996885, 0.996943, 0.997001, 0.997059, 0.997117, 0.997175, 0.997233, 0.997291, 0.997349, 0.997407, 0.997465, 0.997523, 0.997581, 0.997639, 0.997697, 0.997755, 0.997813, 0.997871, 0.997929, 0.997987, 0.998045, 0.998103, 0.998161, 0.998219, 0.998277, 0.998335, 0.998393, 0.998451, 0.998509, 0.998567, 0.998625, 0.998683, 0.998741, 0.998799, 0.998857, 0.998915, 0.998973, 0.999031, 0.999089, 0.999147, 0.999205, 0.999263, 0.999321, 0.999379, 0.999437, 0.999495, 0.999553, 0.999611, 0.999669, 0.999727, 0.999785, 0.999843, 0.999901, 0.999959, 1.000017, 1.000075, 1.000133, 1.000191, 1.000249, 1.000307, 1.000365, 1.000423, 1.000481, 1.000539, 1.000597, 1.000655, 1.000713, 1.000771, 1.000829, 1.000887, 1.000945, 1.001003, 1.001061, 1.001119, 1.001177, 1.001235, 1.001293, 1.001351, 1.001409, 1.001467, 1.001525, 1.001583, 1.001641, 1.001699, 1.001757, 1.001815, 1.001873, 1.001931, 1.001989, 1.002047, 1.002105, 1.002163, 1.002221, 1.002279, 1.002337, 1.002395, 1.002453, 1.002511, 1.002569, 1.002627, 1.002685, 1.002743, 1.002801, 1.002859, 1.002917, 1.002975, 1.003033, 1.003091, 1.003149, 1.003207, 1.003265, 1.003323, 1.003381, 1.003439, 1.003497, 1.003555, 1.003613, 1.003671, 1.003729, 1.003787, 1.003845, 1.003903, 1.003961, 1.004019, 1.004077, 1.004135, 1.004193, 1.004251, 1.004309, 1.004367, 1.004425, 1.004483, 1.004541, 1.004599, 1.004657, 1.004715, 1.004773, 1.004831, 1.004889, 1.004947, 1.005005, 1.005063, 1.005121, 1.005179, 1.005237, 1.005295, 1.005353, 1.005411, 1.005469, 1.005527, 1.005585, 1.005643, 1.005701, 1.005759, 1.005817, 1.005875, 1.005933, 1.005991, 1.006049, 1.006107, 1.006165, 1.006223, 1.006281, 1.006339, 1.006397, 1.006455, 1.006513, 1.006571, 1.006629, 1.006687, 1.006745, 1.006803, 1.006861, 1.006919, 1.006977, 1.007035, 1.007093, 1.007151, 1.007209, 1.007267, 1.007325, 1.007383, 1.007441, 1.007499, 1.007557, 1.007615, 1.007673, 1.007731, 1.007789, 1.007847, 1.007905, 1.007963, 1.008021, 1.008079, 1.008137, 1.008195, 1.008253, 1.008311, 1.008369, 1.008427, 1.008485, 1.008543, 1.008601, 1.008659, 1.008717, 1.008775, 1.008833, 1.008891, 1.008949, 1.009007, 1.009065, 1.009123, 1.009181, 1.009239, 1.009297, 1.009355, 1.009413, 1.009471, 1.009529, 1.009587, 1.009645, 1.009703, 1.009761, 1.009819, 1.009877, 1.009935, 1.009993, 1.010051, 1.010109, 1.010167, 1.010225, 1.010283, 1.010341, 1.010399, 1.010457, 1.010515, 1.010573, 1.010631, 1.010689, 1.010747, 1.010805, 1.010863, 1.010921, 1.010979, 1.011037, 1.011095, 1.011153, 1.011211, 1.011269, 1.011327, 1.011385, 1.011443, 1.011501, 1.011559, 1.011617, 1.011675, 1.011733, 1.011791, 1.011849, 1.011907, 1.011965, 1.012023, 1.012081, 1.012139, 1.012197, 1.012255, 1.012313, 1.012371, 1.012429, 1.012487, 1.012545, 1.012603, 1.012661, 1.012719, 1.012777, 1.012835, 1.012893, 1.012951, 1.013009, 1.013067, 1.013125, 1.013183, 1.013241, 1.013299, 1.013357, 1.013415, 1.013473, 1.013531, 1.013589, 1.013647, 1.013705, 1.013763, 1.013821, 1.013879, 1.013937, 1.013995, 1.014053, 1.014111, 1.014169, 1.014227, 1.014285, 1.014343, 1.014401, 1.014459, 1.014517, 1.014575, 1.014633, 1.014691, 1.014749, 1.014807, 1.014865, 1.014923, 1.014981, 1.015039, 1.015097, 1.015155, 1.015213, 1.015271, 1.015329, 1.015387, 1.015445, 1.015503, 1.015561, 1.015619, 1.015677, 1.015735, 1.015793, 1.015851, 1.015909, 1.015967, 1.016025, 1.016083, 1.016141, 1.016199, 1.016257, 1.016315, 1.016373, 1.016431, 1.016489, 1.016547, 1.016605, 1.016663, 1.016721, 1.016779, 1.016837, 1.016895, 1.016953, 1.017011, 1.017069, 1.017127, 1.017185, 1.017243, 1.017301, 1.017359, 1.017417, 1.017475, 1.017533, 1.017591, 1.017649, 1.017707, 1.017765, 1.017823, 1.017881, 1.017939, 1.017997, 1.018055, 1.018113, 1.018171, 1.018229, 1.018287, 1.018345, 1.018403, 1.018461, 1.018519, 1.018577, 1.018635, 1.018693, 1.018751, 1.018809, 1.018867, 1.018925, 1.018983, 1.019041, 1.019099, 1.019157, 1.019215, 1.019273, 1.019331, 1.019389, 1.019447, 1.019505, 1.019563, 1.019621, 1.019679, 1.019737, 1.019795, 1.019853, 1.019911, 1.019969, 1.020027, 1.020085, 1.020143, 1.020201, 1.020259, 1.020317, 1.020375, 1.020433, 1.020491, 1.020549, 1.020607, 1.020665, 1.020723, 1.020781, 1.020839, 1.020897, 1.020955, 1.021013, 1.021071, 1.021129, 1.021187, 1.021245, 1.021303, 1.021361, 1.021419, 1.021477, 1.021535, 1.021593, 1.021651, 1.021709, 1.021767, 1.021825, 1.021883, 1.021941, 1.021999, 1.022057, 1.022115, 1.022173, 1.022231, 1.022289, 1.022347, 1.022405, 1.022463, 1.022521, 1.022579, 1.022637, 1.022695, 1.022753, 1.022811, 1.022869, 1.022927, 1.022985, 1.023043, 1.023101, 1.023159, 1.023217, 1.023275, 1.023333, 1.023391, 1.023449, 1.023507, 1.023565, 1.023623, 1.023681, 1.023739, 1.023797, 1.023855, 1.023913, 1.023971, 1.024029, 1.024087, 1.024145, 1.024203, 1.024261, 1.024319, 1.024377, 1.024435, 1.024493, 1.024551, 1.024609, 1.024667, 1.024725, 1.024783, 1.024841, 1.024899, 1.024957, 1.025015, 1.025073, 1.025131, 1.025189, 1.025247, 1.025305, 1.025363, 1.025421, 1.025479, 1.025537, 1.025595, 1.025653, 1.025711, 1.025769, 1.025827, 1.025885, 1.025943, 1.026001, 1.026059, 1.026117, 1.026175, 1.026233, 1.026291, 1.026349, 1.026407, 1.026465, 1.026523, 1.026581, 1.026639, 1.026697, 1.026755, 1.026813, 1.026871, 1.026929, 1.026987, 1.027045, 1.027103, 1.027161, 1.027219, 1.027277, 1.027335, 1.027393, 1.027451, 1.027509, 1.027567, 1.027625, 1.027683, 1.027741, 1.027799, 1.027857, 1.027915, 1.027973, 1.028031, 1.028089, 1.028147, 1.028205, 1.028263, 1.028321, 1.028379, 1.028437, 1.028495, 1.028553, 1.028611, 1.028669, 1.028727, 1.028785, 1.028843, 1.028901, 1.028959, 1.029017, 1.029075, 1.029133, 1.029191, 1.029249, 1.029307, 1.029365, 1.029423, 1.029481, 1.029539, 1.029597, 1.029655, 1.029713, 1.029771, 1.029829, 1.029887, 1.029945, 1.030003, 1.030061, 1.030119, 1.030177, 1.030235, 1.030293, 1.030351, 1.030409, 1.030467, 1.030525, 1.030583, 1.030641, 1.030699, 1.030757, 1.030815, 1.030873, 1.030931, 1.030989, 1.031047, 1.031105, 1.031163, 1.031221, 1.031279, 1.031337, 1.031395, 1.031453, 1.031511, 1.031569, 1.031627, 1.031685, 1.031743, 1.031801, 1.031859, 1.031917, 1.031975, 1.032033, 1.032091, 1.032149, 1.032207, 1.032265, 1.032323, 1.032381, 1.032439, 1.032497, 1.032555, 1.032613, 1.032671, 1.032729, 1.032787, 1.032845, 1.032903, 1.032961, 1.033019, 1.033077, 1.033135, 1.033193, 1.033251, 1.033309, 1.033367, 1.033425, 1.033483, 1.033541, 1.033599, 1.033657, 1.033715, 1.033773, 1.033831, 1.033889, 1.033947, 1.034005, 1.034063, 1.034121, 1.034179, 1.034237, 1.034295, 1.034353, 1.034411, 1.034469, 1.034527, 1.034585, 1.034643, 1.034701, 1.034759, 1.034817, 1.034875, 1.034933, 1.034991, 1.035049, 1.035107, 1.035165, 1.035223, 1.035281, 1.035339, 1.035397, 1.035455, 1.035513, 1.035571, 1.035629, 1.035687, 1.035745, 1.035803, 1.035861, 1.035919, 1.035977, 1.036035, 1.036093, 1.036151, 1.036209, 1.036267, 1.036325, 1.036383, 1.036441, 1.036499, 1.036557, 1.036615, 1.036673, 1.036731, 1.036789, 1.036847, 1.036905, 1.036963, 1.037021, 1.037079, 1.037137, 1.037195, 1.037253, 1.037311, 1.037369, 1.037427, 1.037485, 1.037543, 1.037601, 1.037659, 1.037717, 1.037775, 1.037833, 1.037891, 1.037949, 1.038007, 1.038065, 1.038123, 1.038181, 1.038239, 1.038297, 1.038355, 1.038413, 1.038471, 1.038529, 1.038587, 1.038645, 1.038703, 1.038761, 1.038819, 1.038877, 1.038935, 1.038993, 1.039051, 1.039109, 1.039167, 1.039225, 1.039283, 1.039341, 1.039399, 1.039457, 1.039515, 1.039573, 1.039631, 1.039689, 1.039747, 1.039805, 1.039863, 1.039921, 1.039979, 1.040037, 1.040095, 1.040153, 1.040211, 1.040269, 1.040327, 1.040385, 1.040443, 1.040501, 1.040559, 1.040617, 1.040675, 1.040733, 1.040791, 1.040849, 1.040907, 1.040965, 1.041023, 1.041081, 1.041139, 1.041197, 1.041255, 1.041313, 1.041371, 1.041429, 1.041487, 1.041545, 1.041603, 1.041661, 1.041719, 1.041777, 1.041835, 1.041893, 1.041951, 1.042009, 1.042067, 1.042125, 1.042183, 1.042241, 1.042299, 1.042357, 1.042415, 1.042473, 1.042531, 1.042589, 1.042647, 1.042705, 1.042763, 1.042821, 1.042879, 1.042937, 1.042995, 1.043053, 1.043111, 1.043169, 1.043227, 1.043285, 1.043343, 1.043401, 1.043459, 1.043517, 1.043575, 1.043633, 1.043691, 1.043749, 1.043807, 1.043865, 1.043923, 1.043981, 1.044039, 1.044097, 1.044155, 1.044213, 1.044271, 1.044329, 1.044387, 1.044445, 1.044503, 1.044561, 1.044619, 1.044677, 1.044735, 1.044793, 1.044851, 1.044909, 1.044967, 1.045025, 1.045083, 1.045141, 1.045199, 1.045257, 1.045315, 1.045373, 1.045431, 1.045489, 1.045547, 1.045605, 1.045663, 1.045721, 1.045779, 1.045837, 1.045895, 1.045953, 1.046011, 1.046069, 1.046127, 1.046185, 1.046243, 1.046301, 1.046359, 1.046417, 1.046475, 1.046533, 1.046591, 1.046649, 1.046707, 1.046765, 1.046823, 1.046881, 1.046939, 1.046997, 1.047055, 1.047113, 1.047171, 1.047229, 1.047287, 1.047345, 1.047403, 1.047461, 1.047519, 1.047577, 1.047635, 1.047693, 1.047751, 1.047809, 1.047867, 1.047925, 1.047983, 1.048041, 1.048099, 1.048157, 1.048215, 1.048273, 1.048331, 1.048389, 1.048447, 1.048505, 1.048563, 1.048621, 1.048679, 1.048737, 1.048795, 1.048853, 1.048911, 1.048969, 1.049027, 1.049085, 1.049143, 1.049201, 1.049259, 1.049317, 1.049375, 1.049433, 1.049491, 1.049549, 1.049607, 1.049665, 1.049723, 1.049781, 1.049839, 1.049897, 1.049955, 1.050013, 1.050071, 1.050129, 1.050187, 1.050245, 1.050303, 1.050361, 1.050419, 1.050477, 1.050535, 1.050593, 1.050651, 1.050709, 1.050767, 1.050825, 1.050883, 1.050941, 1.050999, 1.051057, 1.051115, 1.051173, 1.051231, 1.051289, 1.051347, 1.051405, 1.051463, 1.051521, 1.051579, 1.051637, 1.051695, 1.051753, 1.051811, 1.051869, 1.051927, 1.051985, 1.052043, 1.052101, 1.052159, 1.052217, 1.052275, 1.052333, 1.052391, 1.052449, 1.052507, 1.052565, 1.052623, 1.052681, 1.052739, 1.052797, 1.052855, 1.052913, 1.052971, 1.053029, 1.053087, 1.053145, 1.053203, 1.053261, 1.053319, 1.053377, 1.053435, 1.053493, 1.053551, 1.053609, 1.053667, 1.053725, 1.053783, 1.053841, 1.053899, 1.053957, 1.054015, 1.054073, 1.054131, 1.054189, 1.054247, 1.054305, 1.054363, 1.054421, 1.054479, 1.054537, 1.054595, 1.054653, 1.054711, 1.054769, 1.054827, 1.054885, 1.054943, 1.054999, 1.055057, 1.055115, 1.0551
```

```
>plot2d("h(x)", -1, 1) :
```

Fungsi

Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Fungsi adalah salah satu konsep dasar dari matematika dan setiap ilmu kuantitatif. Pada dasarnya, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Adapun beberapa jenis fungsi yaitu:

Fungsi Aljabar

Fungsi aljabar adalah fungsi yang dapat didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas, yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan.

Sifat-Sifat Fungsi Aljabar

1. Fungsi Injektif: Fungsi aljabar dapat menjadi injektif jika setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Artinya, jika

maka

2. Fungsi Surjektif: Fungsi aljabar dapat menjadi surjektif jika setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu elemen di domain yang memetakannya ke sana. Artinya, untuk setiap b di kodomain, ada a di domain sehingga

3. Fungsi Bijektif: Fungsi aljabar yang juga bijektif harus memenuhi keduanya, yaitu injektif dan surjektif. Artinya, setiap elemen di domain dipetakan ke elemen unik di kodomain, dan setiap elemen di kodomain dipetakan oleh elemen di domain

Fungsi aljabar dapat memiliki berbagai bentuk kurva tergantung pada jenisnya. Berikut beberapa contoh:

1. Fungsi Polinomial

```
>plot2d("4*x^3-8*x^2-3*x+2") :
```

2. Fungsi Rasional

```
>reset;
>plot2d("(x^2+1)/(x-1)") :
```

3. Fungsi Radikal

```
>reset;
>plot2d("sqrt(x)") :
```

Fungsi Trigonometri

Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang mengaitkan sudut dari segitiga siku-siku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga, serta dapat didefinisikan melalui lingkaran satuan. Fungsi ini mencakup enam jenis utama: sinus (sin), kosinus (cos), tangen (tan), kosekan (csc), sekan (sec), dan kotangen (cot).

Berikut adalah beberapa sifat utama fungsi trigonometri,

- Periodisitas: Fungsi sinus dan kosinus memiliki periode 2π , sedangkan tangen memiliki periode π .

- Amplitudo: Jarak dari garis tengah ke titik maksimum atau minimum; untuk sinus dan kosinus, amplitudonya adalah 1.

- Nilai Maksimum dan Minimum: Sinus dan kosinus memiliki nilai maksimum $+1$ dan minimum -1 ; tangen tidak terbatas.

- Titik Asimtot: Terdapat pada fungsi tangen di

untuk setiap bilangan bulat k .

Fungsi trigonometri memiliki berbagai bentuk kurva tergantung pada jenisnya. Berikut beberapa contoh:

1. Sinus

```
>sin(90°)
```

```
1
```

```
>plot2d("sin(x*pi/180)", 0, 90) :
```

2. Kosinus

```
>cos(60)
```

```
-0.952412980415
```

```
>plot2d("cos(x*pi/180)", 0, 60) :
```

3. Tangen

```
>tan(45°)
```

```
1
```

```
>plot2d("tan(x*pi/180)", 0, 45):
```

Fungsi Eksponensial

Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika yang memiliki bentuk umum:

dimana a adalah bilangan positif yang disebut basis (biasanya), dan x adalah eksponen.

Adapun sifat-sifat dari fungsi eksponensial adalah

- Untuk semua nilai x , fungsi eksponensial selalu menghasilkan nilai positif, yaitu $f(x) > 0$ untuk setiap x .
- Jika $a > 1$, fungsi eksponensial akan meningkat.
- Jika $0 < a < 1$, fungsi eksponensial akan menurun.
- Setiap bilangan yang dipangkatkan nol sama dengan satu, yaitu

- Setiap bilangan yang dipangkatkan satu sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu $a^1 = a$
- Untuk basis yang sama, berlaku sifat penjumlahan: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- Untuk pembagian dengan basis yang sama, berlaku sifat pengurangan: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- Grafik fungsi eksponensial mendekati sumbu x ($y = 0$) tetapi tidak pernah menyentuhnya, sehingga memiliki asimtot horizontal di $y = 0$.
- Turunan dari fungsi eksponensial dengan basis e adalah unik karena hasilnya adalah fungsi itu sendiri, yaitu $\frac{d}{dx}e^x = e^x$

Contoh Kurva fungsi eksponensial:

```
>plot2d("4^x", -2, 2):
```

Fungsi Logaritma

Fungsi logaritma adalah fungsi matematis yang merupakan invers dari fungsi eksponensial. Secara formal, jika kita memiliki fungsi eksponensial

(dengan $a > 0$ dan tidak sama dengan 1), maka fungsi logaritma dapat dinyatakan sebagai

yang berarti logaritma dari x dengan basis a adalah eksponen yang harus dipangkatkan pada a untuk mendapatkan x . Fungsi logaritma memiliki bentuk umum

dengan syarat $x > 0$.

Fungsi logaritma memiliki beberapa sifat penting:

1. Sifat Penjumlahan:

2. Sifat Pengurangan:

3. Sifat Pangkat:

4. Perubahan Basis:

untuk basis yang berbeda.

Berikut contoh kurva fungsi logaritma sederhana:

```
>plot2d("log10(x)", 0.01, 100):  
>plot2d("ln(x)", "log10(x)", 1, 10):
```

Komposisi Fungsi

Komposisi fungsi adalah operasi yang menggabungkan dua atau lebih fungsi untuk membentuk fungsi baru. Dalam notasi, jika terdapat dua fungsi f dan g , komposisi fungsi ditulis sebagai $(f \circ g)(x)$, yang berarti kita pertama-tama menerapkan fungsi x , kemudian hasilnya digunakan sebagai input untuk fungsi f . Secara matematis, ini dapat dinyatakan sebagai $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Adapun sifat-sifat komposisi fungsi

1. Asosiatif:

untuk semua fungsi f, g, h yang terdefinisi dengan baik.

2. Identitas:

dimana $I(x)$ adalah fungsi identitas yang memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri.

3. Tidak komutatif:

tidak sama dengan

kecuali dalam kasus tertentu di mana kedua fungsi tersebut saling berkomutasi.

4. Bijektif: Jika dua fungsi yang dikomposisikan adalah bijektif, maka hasil komposisinya juga bijektif. Ini

berarti bahwa jika f dan g masing-masing injektif dan surjektif, maka $f \circ g$ juga memiliki sifat ini.

Berikut contoh kurva komposisi fungsi:
1.

```
>function f(x) := x^2
>function g(x) := sin(x)
>function h(x) := f(g(x))
>plot2d("h(x)", -pi, pi):
```

2.

```
>function f(x) := cos(x)
>function g(x) := x^3 - 1
>function h(x) := f(g(x))
>plot2d("h(x)", -1, 2):
```

Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan fungsi-fungsi tersebut dan komposisinya di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap fungsi, hitung beberapa nilainya, baik untuk satu nilai maupun vektor. Gambar grafik fungsi-fungsi tersebut dan komposisi-komposisi 2 fungsi.

Juga, carilah fungsi beberapa (dua) variabel. Lakukan hal sama seperti di atas.

Limit Fungsi

Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menggambarkan perilaku suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Limit digunakan untuk memahami perubahan nilai fungsi ketika variabel mendekati suatu titik. Limit dari suatu fungsi $f(x)$ pada titik c adalah nilai yang didekati oleh $f(x)$ saat mendekati c . Notasi limit dinyatakan sebagai:

1. Limit Kiri dan Kanan

- Limit kiri: limit dari fungsi $f(x)$ saat x mendekati c dari sisi kiri atau nilai x lebih kecil dari c dilambangkan dengan

- Limit kanan: limit dari fungsi $f(x)$ saat x mendekati c dari sisi kanan atau nilai x lebih besar dari c dilambangkan dengan $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L^+$

Berikut visualisasi limit ke :

1. Fungsi Aljabar
2. Fungsi Trigonometri
3. Fungsi Eksponensial
4. Fungsi Logaritma
5. Komposisi Fungsi

```
>$limit((x^2-1)/(x-1),x,1)
>function f(x):= x^2-1/x-1
>aspect(1.0); plot2d("(x^2-1)/(x-1)",0,1); plot2d(1,2,>points,style="ow",>add):
>$limit((sin(x))/(x),x,0)
>function f(x):= sin(x)/x

>aspect(1.5); plot2d("(sin(x))/(x)",0,1); plot2d(0,1,>points,style="ow",>add):
```

Limit Kanan

Seperti yang sudah diketahui bahwa bentuk limit kanan adalah

merupakan nilai yang didekati oleh $f(x)$ saat x mendekati a dari arah kanan (atau dari yang lebih besar dari a).

Contohnya:

```
>reset;
>$showev('limit(x-sqrt(2-x),x,2,plus))

>plot2d("x-sqrt(2-x)",-pi,pi); plot2d(0,2,>points,style="ow",>add):
```

Limit Kiri

Seperti yang sudah diketahui bahwa bentuk limit kanan adalah

merupakan nilai yang didekati oleh $f(x)$ saat x mendekati a dari arah kiri (atau dari yang lebih kecil dari a).

Contoh:

```
>reset;
>$showev('limit(abs(2^x),x,2,minus))
>plot2d("2^x",-pi,pi); plot2d(0,2,>points,style="ow",>add):
```

Menghitung Limit

Perhitungan limit pada EMT dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi Maxima, yakni "limit". Fungsi "limit" dapat digunakan untuk menghitung limit fungsi dalam bentuk ekspresi maupun fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nilai limit dapat dihitung pada sebarang nilai atau pada tak hingga (-inf, minf, dan inf). Limit kiri dan limit kanan juga dapat dihitung, dengan cara memberi opsi "plus" atau "minus". Hasil limit dapat berupa nilai, "und" (tak definisi), "ind" (tak tentu namun terbatas), "infinity" (kompleks tak hingga).

Perhatikan beberapa contoh berikut. Perhatikan cara menampilkan perhitungan secara lengkap, tidak hanya menampilkan hasilnya saja.

```
>$$showev('limit(sqrt(x^2-3*x)/(x+1),x,inf))
>$limit((x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18),x,3)
```

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 13x^2 + 51x - 63}{x^3 - 4x^2 - 3x + 18} = -\frac{4}{5}$$

Fungsi tersebut diskontinu di titik x=3. Berikut adalah grafik fungsinya.

```
>aspect(1.5); plot2d("(x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18)",0,4); plot2d(3,-4/5,>points,style="ow",>add):
>$limit(2*x*sin(x)/(1-cos(x)),x,0)
```

$$2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \right) = 4$$

Fungsi tersebut diskontinu di titik x=0. Berikut adalah grafik fungsinya.

```
>plot2d("2*x*sin(x)/(1-cos(x))",-pi,pi); plot2d(0,4,>points,style="ow",>add):
>$limit(cot(7*h)/cot(5*h),h,0)
```

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cot(7h)}{\cot(5h)} = \frac{5}{7}$$

Fungsi tersebut juga diskontinu (karena tidak terdefinisi) di x=0. Berikut adalah grafiknya.

```
>plot2d("cot(7*x)/cot(5*x)",-0.001,0.001); plot2d(0,5/7,>points,style="ow",>add):
>$$showev('limit(((x/8)^(1/3)-1)/(x-8),x,8))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit(1/(2*x-1),x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit((x^2-3*x-10)/(x-5),x,5))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit(sqrt(x^2+x)-x,x,inf))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit(abs(x-1)/(x-1),x,1,minus))
```

Hitung limit di atas untuk x menuju 1 dari kanan.

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit(sin(x)/x,x,0))
>plot2d("sin(x)/x",-pi,pi); plot2d(0,1,>points,style="ow",>add):
>$$showev('limit(sin(x^3)/x,x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit(log(x),x,minf))
>$$showev('limit((-2)^x,x,inf))
>$$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,2,minus))
>$$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,2,plus))
>$$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,5,plus)) // Perhatikan hasilnya
>plot2d("x-sqrt(2-x)",0,2):
>$$showev('limit((x^2-9)/(2*x^2-5*x-3),x,3))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit((1-cos(x))/x,x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit((x^2+abs(x))/(x^2-abs(x)),x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$$showev('limit((1+1/x)^x,x,inf))
>plot2d("(1+1/x)^x",0,1000):
>$$showev('limit((1+k/x)^x,x,inf))
>$$showev('limit((1+x)^(1/x),x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$showev('limit((x/(x+k))^x,x,inf))
>$showev('limit((E^x-E^2)/(x-2),x,2))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$showev('limit(sin(1/x),x,0))
>$showev('limit(sin(1/x),x,inf))
>plot2d("sin(1/x)",-0.001,0.001):
```

Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap fungsi, hitung nilai limit fungsi tersebut di beberapa nilai dan di tak hingga. Gambar grafik fungsi tersebut untuk mengkonfirmasi nilai-nilai limit tersebut.

Turunan Fungsi

Definisi turunan:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Berikut adalah contoh-contoh menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan (limit).

```
>$showev('limit(((x+h)^2-x^2)/h,h,0)) // turunan x^2
>p := expand((x+h)^2-x^2)|simplify; $p //pembilang dijabarkan dan disederhanakan
>q :=ratsimp(p/h); $q // ekspresi yang akan dihitung limitnya disederhanakan
>$limit(q,h,0) // nilai limit sebagai turunan
>$showev('limit(((x+h)^n-x^n)/h,h,0)) // turunan x^n
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, ekspansikan $(x+h)^n$ dengan menggunakan teorema binomial.

```
>$showev('limit((sin(x+h)-sin(x))/h,h,0)) // turunan sin(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, ekspansikan $\sin(x+h)$ dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut.

```
>$showev('limit((log(x+h)-log(x))/h,h,0)) // turunan log(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, gunakan sifat-sifat logaritma dan hasil limit pada bagian sebelumnya di atas.

```
>$showev('limit((1/(x+h)-1/x)/h,h,0)) // turunan 1/x
>$showev('limit((E^(x+h)-E^x)/h,h,0)) // turunan f(x)=e^x
```

```
Answering "Is x an integer?" with "integer"
Answering "Is x an integer?" with "integer"
Answering "Is x an integer?" with "integer"
Answering "Is x an integer?" with "integer"
Answering "Is x an integer?" with "integer"
Maxima is asking
Acceptable answers are: yes, y, Y, no, n, N, unknown, uk
Is x an integer?

Use assume!
Error in:
  $showev('limit((E^(x+h)-E^x)/h,h,0)) // turunan f(x)=e^x ...
^
```

Maxima bermasalah dengan limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

Oleh karena itu diperlukan trik khusus agar hasilnya benar.

```
>$showev('limit((E^h-1)/h,h,0))
>$showev('factor(E^(x+h)-E^x))
>$showev('limit(factor((E^(x+h)-E^x)/h),h,0)) // turunan f(x)=e^x
>function f(x) := x^x
```

$$x^x$$

```
>$showev('limit(f(x),x,0))
```

Silakan Anda gambar kurva

$$y = x^x.$$

```
>$showev('limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0)) // turunan f(x)=x^x
```

Di sini Maxima juga bermasalah terkait limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{x+h} - x^x}{h}$$

Dalam hal ini diperlukan asumsi nilai x.

```
>assume(x>0); $showev('limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0)) // turunan f(x)=x^x
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

```
>&forget(x>0) // jangan lupa, lupakan asumsi untuk kembali ke semula
```

```
[x > 0]
```

```
>&forget(x<0)
```

```
[x < 0]
```

```
>&facts()
```

```
[]
```

```
>$showev('limit((asin(x+h)-asin(x))/h,h,0)) // turunan arcsin(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

```
>$showev('limit((tan(x+h)-tan(x))/h,h,0)) // turunan tan(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

```
>function f(x) &= sinh(x) // definisikan f(x)=sinh(x)
```

```
sinh(x)
```

```
>function df(x) &= limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0); $df(x) // df(x) = f'(x)
```

Hasilnya adalah cosh(x), karena

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x).$$

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], -pi, pi, color=[blue, red]):  
>function f(x) &= sin(3*x^5+7)^2
```

```
2 5  
sin(3 x + 7)
```

```
>diff(f,3), diffc(f,3)
```

```
1198.32948904  
1198.72863721
```

Apakah perbedaan diff dan diffc?

```
>$showev('diff(f(x),x))  
>% with x=3  
>$float(%)  
>plot2d(f,0,3.1):  
>function f(x) &=5*cos(2*x)-2*x*sin(2*x) // mendefinisikan fungsi f
```

```
5 cos(2 x) - 2 x sin(2 x)
```

```
>function df(x) &=diff(f(x),x) // fd(x) = f'(x)
```

```
- 12 sin(2 x) - 4 x cos(2 x)
```

```
>$f(1)=f(1), $float(f(1)), $f(2)=f(2), $float(f(2)) // nilai f(1) dan f(2)  
>xp=solve("df(x)",1,2,0) // solusi f'(x)=0 pada interval [1, 2]
```



```
1.35822987384
```

```
>df(xp), f(xp) // cek bahwa f'(xp)=0 dan nilai ekstrim di titik tersebut
```

```
0  
-5.67530133759
```

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], 0, 2*pi, color=[blue, red]): //grafik fungsi dan turunannya
```

Turunan Fungsi

Turunan merupakan salah satu materi lanjutan dari limit fungsi. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi.

Definisi turunan (limit):

Berikut adalah beberapa sifat turunan fungsi yang dapat diperhatikan sehingga memudahkan dalam melakukan operasi turunan fungsi antara lain:

1. Aturan Penjumlahan
2. Aturan Pengurangan
3. Aturan Perkalian
4. Aturan Pembagian

(dengan syarat $g(x)$ tidak sama dengan 0)

5. Aturan Rantai

Jika $g(x)$ adalah fungsi dalam fungsi $f(g(x))$

6. Turunan dari konstanta

1. Aturan Penjumlahan

Contoh:

Terdapat $f(x)=2x^2$ dan $g(x)=3x^2$ tentukan nilai $(f+g)'(x)$

```
>$showev('limit((2*(x+h)^2-2*x^2)/h,h,0)+'limit((3*(x+h)^2-3*x^2)/h,h,0)')  
>function f(x) &= 2*x^2
```

$$2x^2$$

```
>function g(x) &= 3*x^2
```

$$3x^2$$

```
>function h(x) &= 10*x
```

$$10x$$

```
>plot2d(["f(x)", "g(x)", "h(x)"]):
```

2. Aturan Pengurangan

Contoh:

Terdapat $f(x)=3x^2+3$ dan $g(x)=2x^2+2$ tentukan nilai dari $(f-g)'(x)$

```
>$showev('limit((3*(x+h)^2+3-(3*x^2+3))/h,h,0) - limit((2*(x+h)^2+2-(2*x^2+2))/h,h,0)')  
>function f(x) &= 3*x^2+3
```

$$3x^2 + 3$$

```
>function g(x) &= 2*x^2+2
```

$$2x^2 + 2$$

```
>function h(x) &= 2*x
```

2 x

```
>plot2d(["f(x)", "g(x)", "h(x)"]):
```

3. Aturan Perkalian

Contoh:

Terdapat $u(x)=(x^3-2) \cdot (x^2-3)$ tentukan nilai $u'(x)$

Kita bisa menentukan terlebih dahulu $f(x)$ dan $g(x)$ dimana $f(x)=x^3-2$ dan $g(x)=x^2-3$ kemudian bisa kita terapkan aturan perkalian

```
>$showev(('limit((x+h)^3-2-(x^3-2))/h,h,0)*(x^2-3)+(x^3-2)*limit((x+h)^2-3-(x^2-3))/h,h,0))
>$expand((2*x)*(x^3-2)+(3*x^2)*(x^2-3))
>function u(x) &= (x^3-2)*(x^2-3)
```

$$(x^2 - 3)(x^3 - 2)$$

```
>function h(x) &= 2*x*(x^3-2)+3*x^2*(x^2-3)
```

$$2x(x^3 - 2) + 3x^2(x^2 - 3)$$

```
>plot2d(["u(x)", "h(x)"]):
```

4. Aturan Pembagian

Contoh:

Terdapat $u(x)=2x^3/x-1$ tentukan nilai $u'(x)$

Kita bisa menentukan terlebih dahulu $f(x)$ dan $g(x)$ dimana $f(x)=2x^3$ dan $g(x)=x-1$ kemudian bisa kita terapkan aturan pembagian

```
>$showev(('limit((2*(x+h)^3-2*x^3)/h,h,0)*(x-1)-(2*x^3)*limit((x+h)-1-(x-1))/h,h,0))/(x-1)^2)
>$expand((6*(x-1)*x^2-2*x^3)/(x-1)^2)
>function u(x) &= 2*x^3/(x-1)
```

$$\frac{2x^3}{x-1}$$

```
>function h(x) &= (6*(x-1)*x^2-2*x^3)/(x-1)^2
```

$$\frac{6(x-1)x^2 - 2x^3}{(x-1)^2}$$

```
>plot2d("u(x)", "h(x)", 5.0):
```

5. Aturan rantai

Contoh:

Terdapat $f(x)=x^2$ dan $g(x)=2x$ tentukan nilai dari $(f(g(x)))'$

Kita bisa menentukan terlebih dahulu $f(g(x))$ yaitu

$f(g(x))=(2x)^2$

$f(g(x))=4x^2$

Sehingga dapat kita gunakan aturan rantai sebagai berikut

```
>$showev(('limit((4*(x+h)^2-4*x^2)/h,h,0)*(limit((2*(x+h)-2*x)/h,h,0)))
```

6. Turunan dari Konstanta

Contoh:

Cari nilai turunan dari 1000

```
>$showev('limit((1000-1000)/h,h,0))
```

Dalam mengetahui cara kerja limit untuk mencari turunan akan diberikan beberapa contoh antara lain:

Pada contoh pertama akan dicari turunan

```
>$showev('limit(((x+h)^2-x^2)/h,h,0))
```

pertama-tama bisa kita uraikan operasi pada pembilang

menguraikan

menjadi

kemudian disederhanakan dengan menghilangkan x^2

menjadi

```
>p &= expand((x+h)^2-x^2)|simplify; $p
```

Kemudian bentuk pecahan

dapat disederhanakan menjadi

```
> q &=ratsimp(p/h); $q
```

Setelah itu bisa dimasukkan nilai limit sebagai turunan dimana h mendekati 0 sehingga didapat turunan dari

adalah

```
>$limit(q,h,0)
```

Pada contoh kedua akan menentukan turunan dari

```
>$showev('limit(((x+h)^n-x^n)/h,h,0))
```

Pada turunan x^n dapat dijabarkan dengan mengekspansikan $(x+h)^n$ menggunakan teorema binomial

kemudian kedua sisi dikurangi dengan x^n didapat

didapat bentuk ruas kanan sama nilainya dengan pembilang pada limit turunan x^n . Sehingga kedua ruas bisa dibagi dengan h didapat

Kemudian memasukkan nilai limit saat h mendekati 0 sehingga didapat

Pada contoh ke 3 menentukan turunan dari $\sin(x)$

```
>$showev('limit((sin(x+h)-sin(x))/h,h,0))
```

pada $f(x+h)$ dapat kita uraikan

kemudian menghitung $f(x+h)-f(x)$

didapat pembilang

yang kemudian dapat dibagi h dan dipecah menjadi

kemudian didapat untuk

* limit dari $\cos(h)-1$ untuk h mendekati 0 adalah 0

* limit dari $\sin(h)$ untuk h mendekati 0 adalah 1

didapat

kemudian dapat kita gabungkan hasil limit didapat

Pada contoh berikutnya akan dicari turunan dari e^x namun maxima bermasalah dengan limit:

Oleh karena itu perlu mengubah bentuk fungsi terlebih dahulu agar bisa mendapat hasil yang benar

```
>$showev('limit((E^h-1)/h,h,0))
```

dengan memfaktorkan pembilang menjadi:

```
>$showev('factor(E^(x+h)-E^x))
```

kemudian bisa kita masukkan hasil faktor tersebut kedalam limit, pada contoh, e^x merupakan konstanta terhadap limit sehingga bisa dikeluarkan

```
>$showev('limit(factor((E^(x+h)-E^x)/h),h,0)) // turunan f(x)=e^x
```

berikut adalah beberapa contoh penggunaan limit pada turunan fungsi

1. turunan dari $1/x$

```
>$showev('limit((1/(x+h)-1/x)/h,h,0))
```

2. Turunan dari $\log(x)$

```
>$showev('limit((log(x+h)-log(x))/h,h,0))
```

3. Turunan dari $\tan(x)$

```
>$showev('limit((tan(x+h)-tan(x))/h,h,0))
```

4. Turunan dari $\arcsin(x)$

```
>$showev('limit((asin(x+h)-asin(x))/h,h,0))
```

Visualisasi Grafik dan Penggunaan Turunan Fungsi

Penggunaan Turunan fungsi antara lain
Menentukan Gradien Garis Singgung

Dimana jika terdapat fungsi $y=f(x)$, maka gradien pada titik tertentu dapat dinyatakan sebagai $m=f'(x)$ sebagai contoh, kita akan cari garis singgung dari suatu grafik fungsi

```
>function f(x) &= x^2-2*x+1
```

$$x^2 - 2x + 1$$

```
>function df(x) &=diff(f(x),x) // fd(x) = f'(x)
```

$$2x - 2$$

Setelah mengetahui turunan fungsi tersebut, kita coba memasukkan nilai $x=2$ maka didapat

kemudian kita masukkan nilai x pada fungsi awal untuk mendapat titik y yaitu

didapat titik singgung pada grafik adalah $(2,1)$ dengan gradien garis $m=2$ yang kemudian dapat kita cari persamaan garisnya:

yang kemudian dapat kita visualisasikan grafiknya

```
>function g(x) &= 2*x-3
```

$$2x - 3$$

```
>plot2d(["f(x)", "g(x)"], color=[blue, red]):
```

Pada turunan pertama fungsi dapat kita gunakan pula untuk menentukan titik kritis suatu fungsi dimana

a adalah absis

Pada turunan kedua fungsi juga dapat kita gunakan untuk menentukan titik maksimum lokal atau titik minimum lokal suatu fungsi dimana c adalah titik kritis

maka c titik minimum lokal

maka c titik maksimum lokal

Berikut adalah contoh lain yaitu fungsi

```
>function f(x) &=5*cos(2*x)-2*x*sin(2*x)
```

$$5 \cos(2x) - 2x \sin(2x)$$

```
>function df(x) &=diff(f(x),x) // fd(x) = f'(x)
```

$$-12 \sin(2x) - 4x \cos(2x)$$

nilai $f(1)$ dan $f(2)$

```
>$'f(1)=f(1), $float(f(1)), $'f(2)=f(2), $float(f(2))
```

solusi $f'(x)=0$ pada interval $[1, 2]$

```
>xp=solve("df(x)",1,2,0)
```

```
1.35822987384
```

cek bahwa $f'(xp)=0$ dan nilai ekstrim di titik tersebut

```
>df(xp), f(xp)
```

```
0  
-5.67530133759
```

grafik fungsi dan turunannya

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], 0, 2*pi, color=[blue, red]):
```

Contoh lain yaitu pada fungsi

```
>function f(x) &= sinh(x)
```

sinh(x)

```
>function df(x) &= limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0); $df(x) // df(x) = f'(x)
```

Didapat hasilnya adalah cosh(x), karena

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], -pi, pi, color=[blue, red]):
```

Perhatikan titik-titik "puncak" grafik $y=f(x)$ dan nilai turunan pada saat grafik fungsinya mencapai titik "puncak" tersebut.

Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap fungsi, tentukan turunannya dengan menggunakan definisi turunan (limit), menggunakan perintah diff, dan secara manual (langkah demi langkah yang dihitung dengan Maxima) seperti contoh-contoh di atas. Gambar grafik fungsi asli dan fungsi turunannya pada sumbu koordinat yang sama.

Integral

EMT dapat digunakan untuk menghitung integral, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Untuk integral tak tentu (simbolik) sudah tentu EMT menggunakan Maxima, sedangkan untuk perhitungan integral tentu EMT sudah menyediakan beberapa fungsi yang mengimplementasikan algoritma kuadratur (perhitungan integral tentu menggunakan metode numerik).

Pada notebook ini akan ditunjukkan perhitungan integral tentu dengan menggunakan Teorema Dasar Kalkulus:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{dengan } F'(x) = f(x).$$

Fungsi untuk menentukan integral adalah integrate. Fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan, baik integral tentu maupun tak tentu (jika fungsinya memiliki antiderivatif). Untuk perhitungan integral tentu fungsi integrate menggunakan metode numerik (kecuali fungsinya tidak integrabel, kita tidak akan menggunakan metode ini).

```
>$showev('integrate(x^n,x))
```

Answering "Is n equal to -1?" with "no"

```
>$showev('integrate(1/(1+x),x))
>$showev('integrate(1/(1+x^2),x))
>$showev('integrate(1/sqrt(1-x^2),x))
>$showev('integrate(sin(x),x,0,pi))
>plot2d("sin(x)",0,2*pi):
>$showev('integrate(sin(x),x,a,b))
>$showev('integrate(x^n,x,a,b))
```

Answering "Is n positive, negative or zero?" with "positive"

```
>$showev('integrate(x^2*sqrt(2*x+1),x))
>$showev('integrate(x^2*sqrt(2*x+1),x,0,2))
>$ratsimp(%)
>$showev('integrate((sin(sqrt(x)+a)*E^sqrt(x))/sqrt(x),x,0,pi^2))
>$factor(%)
>function map f(x) &= E^(-x^2)
```

$$E^{-x^2}$$

```
>$showev('integrate(f(x),x))
```

$$\int \left(\int f(x) dx \right) (x) dx = \int \left(\int f(x) dx \right) (x) dx$$

Fungsi f tidak memiliki antiturunan, integralnya masih memuat integral lain.

$$erf(x) = \int \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} dx.$$

Kita tidak dapat menggunakan teorema Dasar kalkulus untuk menghitung integral tentu fungsi tersebut jika semua batasnya berhingga. Dalam hal ini dapat digunakan metode numerik (rumus kuadratur).

Misalkan kita akan menghitung:

$$\int_0^{\pi} f(x) dx$$

```
>x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):
```

```
Function f not found.
Try list ... to find functions!
Error in:
x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>a ...
```

Integral tentu

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,pi)
```

dapat dihampiri dengan jumlah luas persegi-persegi panjang di bawah kurva $y=f(x)$ tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

```
>t &= makelist(a,a,0,pi-0.1,0.1); // t sebagai list untuk menyimpan nilai-nilai x
>fx &= makelist(f(t[i]+0.1),i,1,length(t)); // simpan nilai-nilai f(x)
>// jangan menggunakan x sebagai list, kecuali Anda pakar Maxima!
```

Hasilnya adalah:

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,pi) = 0.1*sum(fx[i],i,1,length(fx))
```

Jumlah tersebut diperoleh dari hasil kali lebar sub-subinterval (=0.1) dan jumlah nilai-nilai $f(x)$ untuk $x = 0.1, 0.2, 0.3, \dots, 3.2$.

```
>0.1*sum(f(x+0.1)) // cek langsung dengan perhitungan numerik EMT
```

```
0.836219610253
```

Untuk mendapatkan nilai integral tentu yang mendekati nilai sebenarnya, lebar sub-intervalnya dapat diperkecil lagi, sehingga daerah di bawah kurva tertutup semuanya, misalnya dapat digunakan lebar subinterval 0.001. (Silakan dicoba!)

Meskipun Maxima tidak dapat menghitung integral tentu fungsi tersebut untuk batas-batas yang berhingga, namun integral tersebut dapat dihitung secara eksak jika batas-batasnya tak hingga. Ini adalah salah satu keajaiban di dalam matematika, yang terbatas tidak dapat dihitung secara eksak, namun yang tak hingga malah dapat dihitung secara eksak.

```
>$showev('integrate(f(x),x,0,inf))
```

Tunjukkan kebenaran hasil di atas!

Berikut adalah contoh lain fungsi yang tidak memiliki antiderivatif, sehingga integral tentunya hanya dapat dihitung dengan metode numerik.

```
>function f(x) &= x^x
```

$$x^x$$

```
>$showev('integrate(f(x),x,0,1))
>x=0:0.1:1-0.01; plot2d(x,f(x+0.01),>bar); plot2d("f(x)",0,1,>add):
```

Maxima gagal menghitung integral tentu tersebut secara langsung menggunakan perintah integrate. Berikut kita lakukan seperti contoh sebelumnya untuk mendapat hasil atau pendekatan nilai integral tentu tersebut.

```
>t &= makelist(a,a,0,1-0.01,0.01);
>fx &= makelist(f(t[i]+0.01),i,1,length(t));
```

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,1) = 0.01*sum(fx[i],i,1,length(fx))
```

Apakah hasil tersebut cukup baik? perhatikan gambarnya.

```
>function f(x) &= sin(3*x^5+7)^2
```

$$\sin^2(3x^5 + 7)$$

```
>integrate(f,0,1)
```

```
0.542581176074
```

```
>&showev('integrate(f(x),x,0,1))
```

$$\int_0^1 \sin^2(3x^5 + 7) dx = \frac{1}{10} \frac{\Gamma(-\frac{1}{5}) \sin(14) \sin(\frac{\pi}{10})}{\Gamma(\frac{4}{5})} - \left(\frac{1}{6} \Gamma(-\frac{1}{6}) \Gamma(\frac{4}{5}) + \frac{1}{6} \Gamma(-\frac{1}{6}) \Gamma(\frac{4}{5}) \right)$$

$$\sin(14) + \frac{4}{5} \operatorname{I} \gamma_{\text{incomplete}}\left(-, 6 \operatorname{I}\right) - \frac{1}{5} \operatorname{I} \gamma_{\text{incomplete}}\left(-, -6 \operatorname{I}\right) \cos(14) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) - 60/120$$

```
>&float(%)
```

```

1.0
/
[
  2      5
  I sin (3.0 x + 7.0) dx =
]
/
0.0
0.09820784258795788 - 0.008333333333333333
(0.3090169943749474 (0.1367372182078336
(4.192962712629476 I gamma_incomplete(0.2, 6.0 I)
- 4.192962712629476 I gamma_incomplete(0.2, - 6.0 I))
+ 0.9906073556948704 (4.192962712629476 gamma_incomplete(0.2, 6.0 I)
+ 4.192962712629476 gamma_incomplete(0.2, - 6.0 I)) - 60.0)

```

```
>$showev('integrate(x*exp(-x),x,0,1) // Integral tentu (eksak)
```

Aplikasi Integral Tentu

```

>plot2d("x^3-x",-0.1,1.1); plot2d("-x^2",>add); ...
b=solve("x^3-x+x^2",0.5); x=linspace(0,b,200); xi=flip(x); ...
plot2d(x|xi,x^3-x|-xi^2,>filled,style="|",fillcolor=1,>add): // Plot daerah antara 2 kurva
>a=solve("x^3-x+x^2",0), b=solve("x^3-x+x^2",1) // absis titik-titik potong kedua kurva

```

```

0
0.61803398875

```

```
>integrate("(-x^2)-(x^3-x)",a,b) // luas daerah yang diarsir
```

```
0.0758191713542
```

Hasil tersebut akan kita bandingkan dengan perhitungan secara analitik.

```

>a = solve((-x^2)-(x^3-x),x); $a // menentukan absis titik potong kedua kurva secara eksak
>$showev('integrate(-x^2-x^3+x,x,0,(sqrt(5)-1)/2)) // Nilai integral secara eksak
>$float(%)

```

Integral

Jumlah Riemann (Riemann Sum)

Konsep dasar dari integral adalah menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi. Untuk mendekati luas ini secara numerik, kita dapat membagi wilayah di bawah kurva menjadi persegi panjang-persegi panjang kecil, dan kemudian menjumlahkan luasnya. Ini disebut jumlah Riemann, yang menggunakan notasi sigma

```

>function f(x):=x^2+1
>x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):

```

Misalkan kita ingin menghitung luas di bawah kurva fungsi $f(x)$ dari $x=a$ hingga $x=b$. Untuk mendekati luas ini, kita membagi interval $[a,b]$ menjadi n subinterval yang sama panjang, di mana panjang setiap subinterval adalah:

Kemudian kita pilih titik x_i dalam setiap subinterval sebagai titik representatif. Nilai $f(x_i)$ digunakan untuk menentukan tinggi persegi panjang, dan Δx sebagai lebarnya. Jumlah Riemann didefinisikan sebagai:

image: Rumus_Reimann

Hubungan dengan Integral

etika kita meningkatkan jumlah subinterval (yakni n menuju tak hingga), maka pendekatan jumlah Riemann ini semakin mendekati nilai integral. Dengan kata lain, integral tentu dari fungsi $f(x)$ dari a hingga b didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann:

image: Rumus_Hubungan_Integral

Syarat integral

Fungsi Kontinu

Secara matematis, fungsi $f(x)$ dikatakan kontinu pada interval $[a,b]$ jika memenuhi syarat-syarat berikut:

Definisi Kekontinuan fungsi $f(x)$ kontinu pada interval $[a,b]$ jika:

- Terdefinisi: Fungsi harus terdefinisi di setiap titik dalam interval tersebut. Artinya, untuk setiap nilai x dalam interval $[a,b]$, $f(x)$ harus memiliki nilai yang terdefinisi.
- Limit Ada: Limit fungsi harus ada pada setiap titik dalam interval. Untuk setiap titik dalam interval $[a,b]$, limit $x \rightarrow c$ $f(x)$ harus ada.
- Limit Sama dengan Nilai Fungsi: Nilai fungsi pada titik tersebut harus sama dengan limit fungsi ketika mendekati titik tersebut. Yaitu, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Diketahui sebuah fungsi

dari $x=-2$ hingga $x=2$

```
>function h(x):=1/x
>h(-2)
```

-0.5

```
>h(-1)
```

-1

```
>h(0)
```

```
Floating point error!
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
h:
  useglobal; return 1/x
Error in:
h(0) ...
  ^
```

Diketahui fungsi $f(x)$

dari $x=1$ hingga $x=2$

```
>function f(x):=2*x^3-3*x+1
>f(1)
```

0

```
>f(2)
```

11

```
>$limit(2*x^3-3*x+1,x,1)
>$limit(2*x^3-3*x+1,x,2)
```

Integral Tak Tentu

EMT dapat digunakan untuk menghitung integral, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Untuk integral tak tentu (simbolik) sudah tentu EMT menggunakan Maxima.

Pada notebook ini akan ditunjukkan perhitungan integral tentu dengan menggunakan Teorema Dasar Kalkulus:

Fungsi untuk menentukan integral adalah `integrate`. Fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan, baik integral tentu maupun tak tentu (jika fungsinya memiliki antiderivatif).

```
>function f(x):=(1/x^2+1)
>x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):
```

```
>$showev('integrate(1/(1+x^2),x))
```

```
>$showev('integrate((y^2),y))
>function f(x):=(x^5+3*x^2+x+3)
>x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):
>$showev('integrate(x^5+3*x^2+x+3,x))
>$showev('integrate(3*x^3-2*x,x))
>$showev('integrate(x^2*sqrt(2*x+1),x))
>$showev('integrate(cos(2*x),x))
>function map f(x) &= E^(-x^2)
```

$$E^{-x^2}$$

```
>$showev('integrate(f(x),x))
```

Fungsi f tidak memiliki antiturunan, integralnya masih memuat integral lain.
Fungsi error, dinotasikan sebagai $\text{erf}(x)$, didefinisikan sebagai integral tertentu berikut:

Integral tentu

Integral tentu adalah integral matematika yang memiliki batasan atas dan bawah yang jelas, sehingga menghasilkan sebuah nilai. Batasan dari integral tentu adalah a sampai b atau batas atas sampai batas bawah.

Untuk perhitungan integral tentu fungsi integrasi menggunakan metode numerik (kecuali fungsinya tidak integrabel, kita tidak akan menggunakan metode ini).

Kita tidak dapat menggunakan teorema Dasar kalkulus untuk menghitung integral tentu fungsi tersebut jika semua batasnya berhingga. Dalam hal ini dapat digunakan metode numerik (rumus kuadratur).

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,\inf)
```

dapat dihipotesiskan dengan jumlah luas persegi-persegi panjang di bawah kurva $y=f(x)$ tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

```
> function map f(x) &= E^(-x^2)
```

$$E^{-x^2}$$

```
>$showev('integrate(f(x),x)
>x=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):
>t &= makelist(a,a,0,pi-0.1,0.1);
>fx &= makelist(f(t[i]+0.1),i,1,length(t));
>$showev('integrate(f(x),x,0,\inf)
```

- $fx \&=$: Ini adalah operasi penugasan gabungan. Artinya, hasil dari perhitungan di sebelah kanan akan ditambahkan ke variabel fx . Jika fx belum didefinisikan sebelumnya, maka fx akan dibuat sebagai sebuah list. $-makelist(...,i,1,length(t))$: Fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah list.

Parameter-parameternya adalah:

- $f(t[i]+0.1)$: Ini adalah ekspresi yang akan dihitung untuk setiap nilai i . Fungsi f akan dievaluasi pada nilai $t[i]$ ditambah 0.1.
- i : Adalah indeks yang akan digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam list t .
- 1 : Adalah nilai awal untuk indeks i .
- $length(t)$: Adalah nilai akhir untuk indeks i , yaitu panjang dari list t .

```
>$showev('integrate(x*exp(-x),x,0,1)
```

tentukan integral dari

darix=1 sampai x=2

```
>function h(x):=3*x^2+4*x+2
>$showev('integrate(3*x^2+4*x+2,x,1,2)
>$showev('integrate(ln(x),x,1,2)
>$showev('integrate(sin(x),x,0,pi)
>$showev('integrate(cos(2*x),x)
```

Aplikasi Integral Tentu

1. Panjang Kurva

Panjang kurva dari kurva $y=f(x)$ pada interval $[a,b]$ dapat dihitung dengan menggunakan integral. Panjang kurva L dapat didefinisikan sebagai:
image: Rumus_Panjang_Kurva
Tentukan panjang kurva

dari $x=0$ hingga $x=2$

```
>&diff(x^2, x)
```

$$2x$$

```
>$showev('integrate(sqrt(1+(2*x)^2), x, 0, 2))
```

Panjang Kurva

Hitunglah panjang kurva berikut ini dan luas daerah di dalam kurva tersebut.

$$\gamma(t) = (r(t) \cos(t), r(t) \sin(t))$$

dengan

$$r(t) = 1 + \frac{\sin(3t)}{2}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

```
>t=linspace(0,2pi,1000); r=1+sin(3*t)/2; x=r*cos(t); y=r*sin(t); ...
plot2d(x,y,>filled,fillcolor=red,style="/",r=1.5): // Kita gambar kurvanya terlebih dahulu
>function r(t) &= 1+sin(3*t)/2; $'r(t)=r(t)
>function fx(t) &= r(t)*cos(t); $'fx(t)=fx(t)
```

```
>function fy(t) &= r(t)*sin(t); $'fy(t)=fy(t)
>function ds(t) &= trigreduce(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'ds(t)=ds(t)
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... e(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'ds(t)=ds(t ...
^
```

```
>$integrate(ds(x),x,0,2*pi) //panjang (keliling) kurva
```

Maxima gagal melakukan perhitungan eksak integral tersebut.

Berikut kita hitung integralnya secara numerik dengan perintah EMT.

```
>integrate("ds(x)",0,2*pi)
```

```
Function ds not found.
Try list ... to find functions!
Error in expression: ds(x)
%mapexpression1:
return expr(x,args());
Error in map.
%evalexpression:
if maps then return %mapexpression1(x,f$,args());
gauss:
if maps then y=%evalexpression(f$,a+h-(h*xn)',maps,args());
adaptivegauss:
tl=gauss(f$,c,c+h;args(),=maps);
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
integrate:
return adaptivegauss(f$,a,b,eps*1000;args(),=maps);
```

Spiral Logaritmik

$$x = e^{ax} \cos x, y = e^{ax} \sin x.$$

```
>a=0.1; plot2d("exp(a*x)*cos(x)", "exp(a*x)*sin(x)", x=2, xmin=0, xmax=2*pi):
>&kill(a) // hapus ekspresi a
```

done

```
>function fx(t) &= exp(a*t)*cos(t); $'fx(t)=fx(t)
>function fy(t) &= exp(a*t)*sin(t); $'fy(t)=fy(t)
>function df(t) &= trigreduce(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'df(t)=df(t)
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... e(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'df(t)=df(t ...
^
```

```
>S &=integrate(df(t),t,0,2*pi); $S // panjang kurva (spiral)
```

```
Maxima said:
defint: variable of integration cannot be a constant; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
S &=integrate(df(t),t,0,2*pi); $S // panjang kurva (spiral) ...
^
```

```
>S(a=0.1) // Panjang kurva untuk a=0.1
```

```
Function S not found.
Try list ... to find functions!
Error in:
S(a=0.1) // Panjang kurva untuk a=0.1 ...
^
```

Soal:

Tunjukkan bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari r adalah $K=2\pi.r$.

Berikut adalah contoh menghitung panjang parabola.

```
>plot2d("x^2", xmin=-1, xmax=1):
>$showev('integrate(sqrt(1+diff(x^2,x)^2),x,-1,1))
>$float(%)
>x=-1:0.2:1; y=x^2; plot2d(x,y); ...
plot2d(x,y,points=1,style="o#",add=1):
```

Panjang tersebut dapat dihipotesis dengan menggunakan jumlah panjang ruas-ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada parabola tersebut.

```
>i=1:cols(x)-1; sum(sqrt((x[i+1]-x[i])^2+(y[i+1]-y[i])^2))
```

```
2.95191957027
```

Hasilnya mendekati panjang yang dihitung secara eksak. Untuk mendapatkan hampiran yang cukup akurat, jarak antar titik dapat diperkecil, misalnya 0.1, 0.05, 0.01, dan seterusnya. Cobalah Anda ulangi perhitungannya dengan nilai-nilai tersebut.

Koordinat Kartesius

Berikut diberikan contoh perhitungan panjang kurva menggunakan koordinat Kartesius. Kita akan hitung panjang kurva dengan persamaan implisit:

$$x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

```
>z = x^3+y^3-3*x*y; $z
>plot2d(z,r=2,level=0,n=100):
```

Kita tertarik pada kurva di kuadran pertama.

```
>plot2d(z,a=0,b=2,c=0,d=2,level=[-10;0],n=100,contourwidth=3,style=""): 
```

Kita selesaikan persamaannya untuk x.

```
>$z with y=l*x, sol = solve(%,x); $sol
```

Kita gunakan solusi tersebut untuk mendefinisikan fungsi dengan Maxima.

```
>function f(l) = rhs(sol[1]); $'f(l)=f(l)
```

Fungsi tersebut juga dapat digunakan untuk menggambar kurvanya. Ingat, bahwa fungsi tersebut adalah nilai x dan nilai y=l*x, yakni x=f(l) dan y=l*f(l).

```
>plot2d(&f(x), &x*f(x), xmin=-0.5, xmax=2, a=0, b=2, c=0, d=2, r=1.5):
```

Elemen panjang kurva adalah:

```
>function ds(l) = ratsimp(sqrt(diff(f(l),l)^2+diff(l*f(l),l)^2)); $'ds(l)=ds(l)
>$integrate(ds(l),l,0,1)
```

Integral tersebut tidak dapat dihitung secara eksak menggunakan Maxima. Kita hitung integral tersebut secara numerik dengan Euler. Karena kurva simetris, kita hitung untuk nilai variabel integrasi dari 0 sampai 1, kemudian hasilnya dikalikan 2.

```
>2*integrate("ds(x)",0,1)
```

```
4.91748872168
```

```
>2*romberg(&ds(x),0,1)// perintah Euler lain untuk menghitung nilai hampiran integral yang sama
```

```
4.91748872168
```

Perhitungan di atas dapat dilakukan untuk sebarang fungsi x dan y dengan mendefinisikan fungsi EMT, misalnya kita beri nama panjangkurva. Fungsi ini selalu memanggil Maxima untuk menurunkan fungsi yang diberikan.

```
>function panjangkurva(fx,fy,a,b) ...
ds=mxm("sqrt(diff(@fx,x)^2+diff(@fy,x)^2)");
return romberg(ds,a,b);
endfunction
```

```
>panjangkurva("x","x^2",-1,1) // cek untuk menghitung panjang kurva parabola sebelumnya
```

```
2.95788571509
```

Bandingkan dengan nilai eksak di atas.

```
>2*panjangkurva(mxm("f(x)",mxm("x*f(x)"),0,1) // cek contoh terakhir, bandingkan hasilnya!
```

```
4.91748872168
```

Kita hitung panjang spiral Archimedes berikut ini dengan fungsi tersebut.

```
>plot2d("x*cos(x)","x*sin(x)",xmin=0,xmax=2*pi,square=1):
>panjangkurva("x*cos(x)","x*sin(x)",0,2*pi)
```

```
21.2562941482
```

Berikut kita definisikan fungsi yang sama namun dengan Maxima, untuk perhitungan eksak.

```
>&kill (ds, x, fx, fy)
```

```
done
```

```
>function ds(fx,fy) &&= sqrt(diff(fx,x)^2+diff(fy,x)^2)
```

$$\sqrt{\text{diff}(fy, x)^2 + \text{diff}(fx, x)^2}$$

```
>sol &= ds(x*cos(x),x*sin(x)); $sol // Kita gunakan untuk menghitung panjang kurva terakhir di atas  
>$sol | trigreduce | expand, $integrate(%,x,0,2*pi), %()
```

```
21.2562941482
```

Hasilnya sama dengan perhitungan menggunakan fungsi EMT.

Berikut adalah contoh lain penggunaan fungsi Maxima tersebut.

```
>plot2d("3*x^2-1", "3*x^3-1", xmin=-1/sqrt(3), xmax=1/sqrt(3), square=1):  
>sol &= radcan(ds(3*x^2-1, 3*x^3-1)); $sol  
>$showev('integrate(sol,x,0,1/sqrt(3))), $2*float(%) // panjang kurva di atas
```

Sikloid

Berikut kita akan menghitung panjang kurva lintasan (sikloid) suatu titik pada lingkaran yang berputar ke kanan pada permukaan datar. Misalkan jari-jari lingkaran tersebut adalah r . Posisi titik pusat lingkaran pada saat t adalah:

$$(rt, r).$$

Misalkan posisi titik pada lingkaran tersebut mula-mula $(0,0)$ dan posisinya pada saat t adalah:

$$(r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t))).$$

Berikut kita plot lintasan tersebut dan beberapa posisi lingkaran ketika $t=0$, $t=\pi/2$, $t=\pi$.

```
>x &= r*(t-sin(t))
```

```
[0, 1.66665833335744e-7 r, 1.33330666692022e-6 r,  
4.499797504338432e-6 r, 1.066581336583994e-5 r,  
2.083072932167196e-5 r, 3.599352055540239e-5 r,  
5.71526624672386e-5 r, 8.530603082730626e-5 r,  
1.214508019889565e-4 r, 1.665833531718508e-4 r,  
2.216991628251896e-4 r, 2.877927110806339e-4 r,  
3.658573803051457e-4 r, 4.568853557635201e-4 r,  
5.618675264007778e-4 r, 6.817933857540259e-4 r,  
8.176509330039827e-4 r, 9.704265741758145e-4 r,  
0.001141105023499428 r, 0.001330669204938795 r,  
0.001540100153900437 r, 0.001770376919130678 r,  
0.002022476464811601 r, 0.002297373572865413 r,  
0.002596040745477063 r, 0.002919448107844891 r,  
0.003268563311168871 r, 0.003644351435886262 r,  
0.004047774895164447 r, 0.004479793338660443 r, 0.0049413635565565 r,  
0.005433439383882244 r, 0.005956971605131645 r,  
0.006512907859185624 r, 0.007102192544548636 r,  
0.007725766724910044 r, 0.00838456803503801 r,  
0.009079530587017326 r, 0.009811584876838586 r, 0.0105816576913495 r,  
0.01139067201557714 r, 0.01223954694042984 r, 0.01312919757078923 r,  
0.01406053493400045 r, 0.01503446588876983 r, 0.01605189303448024 r,  
0.01711371462093175 r, 0.01822082445851714 r, 0.01937411182884202 r,  
0.02057446139579705 r, 0.02182275311709253 r, 0.02311986215626333 r,  
0.02446665879515308 r, 0.02586400834688696 r, 0.02731277106934082 r,  
0.02881380207911666 r, 0.03036795126603076 r, 0.03197606320812652 r,  
0.0336389770872163 r, 0.03535752660496472 r, 0.03713253989951881 r,  
0.03896483946269502 r, 0.0408552420577305 r, 0.04280455863760801 r,  
0.04481359426396048 r, 0.04688314802656623 r, 0.04901401296344043 r,  
0.05120697598153157 r, 0.05346281777803219 r, 0.05578231276230905 r,  
0.05816622897846346 r, 0.06061532802852698 r, 0.0631303649963022 r,  
0.06571208837185505 r, 0.06836123997666599 r, 0.07107855488944881 r,  
0.07386476137264342 r, 0.07672058079958999 r, 0.07964672758239233 r,  
0.08264390910047736 r, 0.0857128256298576 r, 0.08885417027310427 r,  
0.09206862889003742 r, 0.09535688002914089 r, 0.0987195948597075 r,  
0.1021574371047232 r, 0.1056710629744951 r, 0.1092611211010309 r,  
0.1129282524731764 r, 0.1166730903725168 r, 0.1204962603100498 r,  
0.1243983799636342 r, 0.1283800591162231 r, 0.1324418995948859 r,  
0.1365844952106265 r, 0.140808431699002 r, 0.1451142866615502 r,  
0.1495026295080298 r, 0.1539740213994798 r]
```

```
>y &= r*(1-cos(t))
```

```
[0, 4.999958333473664e-5 r, 1.999933334222437e-4 r,  
4.499662510124569e-4 r, 7.998933390220841e-4 r,  
0.001249739605033717 r, 0.00179946006479581 r,  
0.002448999746720415 r, 0.003198293697380561 r,  
0.004047266988005727 r, 0.004995834721974179 r,  
0.006043902043303184 r, 0.00719136414613375 r, 0.00843810628521191 r,
```

```

0.009784003787362772 r, 0.01122892206395776 r, 0.01277271662437307 r,
0.01441523309043924 r, 0.01615630721187855 r, 0.01799576488272969 r,
0.01993342215875837 r, 0.02196908527585173 r, 0.02410255066939448 r,
0.02633360499462523 r, 0.02866202514797045 r, 0.03108757828935527 r,
0.03361002186548678 r, 0.03622910363410947 r, 0.03894456168922911 r,
0.04175612448730281 r, 0.04466351087439402 r, 0.04766643011428662 r,
0.05076458191755917 r, 0.0539576564716131 r, 0.05724533447165381 r,
0.06062728715262111 r, 0.06410317632206519 r, 0.06767265439396564 r,
0.07133536442348987 r, 0.07509094014268702 r, 0.07893900599711501 r,
0.08287917718339499 r, 0.08691105968769186 r, 0.09103425032511492 r,
0.09524833678003664 r, 0.09955289764732322 r, 0.1039475024744748 r,
0.1084317118046711 r, 0.113005077220716 r, 0.1176671413898787 r,
0.1224174381096274 r, 0.1272554923542488 r, 0.1321808203223502 r,
0.1371929294852391 r, 0.1422913186361759 r, 0.1474754779404944 r,
0.152744888986584 r, 0.1580990248377314 r, 0.1635373500848132 r,
0.1690593208998367 r, 0.1746643850903219 r, 0.1803519821545206 r,
0.1861215433374662 r, 0.1919724916878484 r, 0.1979042421157076 r,
0.2039162014509444 r, 0.2100077685026351 r, 0.216178334119151 r,
0.2224272812490723 r, 0.2287539850028937 r, 0.2351578127155118 r,
0.2416381240094921 r, 0.2481942708591053 r, 0.2548255976551299 r,
0.2615314412704124 r, 0.2683111311261794 r, 0.2751639892590951 r,
0.2820893303890569 r, 0.2890864619877229 r, 0.2961546843477643 r,
0.3032932906528349 r, 0.3105015670482534 r, 0.3177787927123868 r,
0.3251242399287333 r, 0.3325371741586922 r, 0.3400168541150183 r,
0.3475625318359485 r, 0.3551734527599992 r, 0.3628488558014202 r,
0.3705879734263036 r, 0.3783900317293359 r, 0.3862542505111889 r,
0.3941798433565377 r, 0.4021660177127022 r, 0.4102119749689023 r,
0.418316910536117 r, 0.4264800139275439 r, 0.4347004688396462 r,
0.4429774532337832 r, 0.451310139418413 r]

```

Berikut kita gambar sikloid untuk $r=1$.

```

>ex &= x-sin(x); ey &= 1-cos(x); aspect(1);
>plot2d(ex,ey,xmin=0,xmax=4pi,square=1); ...
plot2d("2*cos(x)", "1+sin(x)", xmin=0, xmax=2pi, >add, color=blue); ...
plot2d([2,ex(2)], [1,ey(2)], color=red, >add); ...
plot2d(ex(2), ey(2), >points, >add, color=red); ...
plot2d("2pi*cos(x)", "1+sin(x)", xmin=0, xmax=2pi, >add, color=blue); ...
plot2d([2pi,ex(2pi)], [1,ey(2pi)], color=red, >add); ...
plot2d(ex(2pi), ey(2pi), >points, >add, color=red):

```

```

Error : [0,1.66665833335744e-7*r-sin(1.66665833335744e-7*r),1.33330666692022e-6*r-sin(1.33330666692022e-6*

```

Error generated by error() command

```

adaptiveeval:
error(f$| " does not produce a real or column vector");
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
dw/n,dw/n^2,dw/n;args();

```

Berikut dihitung panjang lintasan untuk 1 putaran penuh. (Jangan salah menduga bahwa panjang lintasan 1 putaran penuh sama dengan keliling lingkaran!)

```

>ds &= radcan(sqrt(diff(ex,x)^2+diff(ey,x)^2)); $ds=trigsimp(ds) // elemen panjang kurva sikloid

```

```

Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

```

```

Error in:
ds &= radcan(sqrt(diff(ex,x)^2+diff(ey,x)^2)); $ds=trigsimp(ds ...

```

```

>ds &= trigsimp(ds); $ds
>$showev('integrate(ds,x,0,2*pi)) // hitung panjang sikloid satu putaran penuh

```

```

Maxima said:
defint: variable of integration must be a simple or subscripted variable.
defint: found errexp1
#0: showev(f='integrate(ds,[0,1.66665833335744e-7*r,1.33330666692022e-6*r,4.499797504338432e-6*r,1.0665811
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

```

```

Error in:
$showev('integrate(ds,x,0,2*pi)) // hitung panjang sikloid sat ...

```

```

>integrate(mxm("ds"),0,2*pi) // hitung secara numerik

```

```

Illegal function result in map.
%evalexpression:
if maps then return %mapexpression1(x,f$;args());
gauss:
if maps then y=%evalexpression(f$,a+h-(h*xn)',maps;args());
adaptivegauss:
t1=gauss(f$,c,c+h;args(),=maps);
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
integrate:
return adaptivegauss(f$,a,b,eps*1000;args(),=maps);

```

```

>romberg(mxm("ds"),0,2*pi) // cara lain hitung secara numerik

```

Wrong argument!

Cannot combine a symbolic expression here.
Did you want to create a symbolic expression?
Then start with &.

Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
romberg:
if cols(y)==1 then return y*(b-a); endif;
Error in:
romberg(mxm("ds"),0,2*pi) // cara lain hitung secara numerik ...

Perhatikan, seperti terlihat pada gambar, panjang sikloid lebih besar daripada keliling lingkarannya, yakni:

$$2\pi.$$

Kurvatur (Kelengkungan) Kurva

image: Osculating.png

Aslinya, kelengkungan kurva diferensiabel (yakni, kurva mulus yang tidak lancip) di titik P didefinisikan melalui lingkaran oskulasi (yaitu, lingkaran yang melalui titik P dan terbaik memperkirakan, paling banyak menyinggung kurva di sekitar P). Pusat dan radius kelengkungan kurva di P adalah pusat dan radius lingkaran oskulasi. Kelengkungan adalah kebalikan dari radius kelengkungan:

$$\kappa = \frac{1}{R}$$

dengan R adalah radius kelengkungan. (Setiap lingkaran memiliki kelengkungan ini pada setiap titiknya, dapat diartikan, setiap lingkaran berputar 2π sejauh $2\pi R$.) Definisi ini sulit dimanipulasi dan dinyatakan ke dalam rumus untuk kurva umum. Oleh karena itu digunakan definisi lain yang ekuivalen.

Definisi Kurvatur dengan Fungsi Parametrik Panjang Kurva

Setiap kurva diferensiabel dapat dinyatakan dengan persamaan parametrik terhadap panjang kurva s:

$$\gamma(s) = (x(s), y(s)),$$

dengan x dan y adalah fungsi riil yang diferensiabel, yang memenuhi:

$$\|\gamma'(s)\| = \sqrt{x'(s)^2 + y'(s)^2} = 1.$$

Ini berarti bahwa vektor singgung

$$\mathbf{T}(s) = (x'(s), y'(s))$$

memiliki norm 1 dan merupakan vektor singgung satuan.

Apabila kurvanya memiliki turunan kedua, artinya turunan kedua x dan y ada, maka $\mathbf{T}'(s)$ ada. Vektor ini merupakan normal kurva yang arahnya menuju pusat kurvatur, norm-nya merupakan nilai kurvatur (kelengkungan):

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(s) &= \gamma'(s), \\ \mathbf{T}^2(s) &= 1 \text{ (konstanta)} \Rightarrow \mathbf{T}'(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0 \\ \kappa(s) &= \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\gamma''(s)\| = \sqrt{x''(s)^2 + y''(s)^2}.\end{aligned}$$

Nilai

$$R(s) = \frac{1}{\kappa(s)}$$

disebut jari-jari (radius) kelengkungan kurva.

Bilangan riil

$$k(s) = \pm\kappa(s)$$

disebut nilai kelengkungan bertanda.

Contoh:

Akan ditentukan kurvatur lingkaran

$$x = r \cos t, \quad y = r \sin t.$$

```
>fx &= r*cos(t); fy &=r*sin(t);  
>&assume(t>0,r>0); s &=integrate(sqrt(diff(fx,t)^2+diff(fy,t)^2),t,0,t); s // elemen panjang kurva, panjang bu
```

```
Maxima said:  
diff: second argument must be a variable; found errexp1  
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:  
... =integrate(sqrt(diff(fx,t)^2+diff(fy,t)^2),t,0,t); s // elemen ...
```

```
>&kill(s); fx &= r*cos(s/r); fy &=r*sin(s/r); // definisi ulang persamaan parametrik terhadap s dengan substit  
>k &= trigsimp(sqrt(diff(fx,s,2)^2+diff(fy,s,2)^2)); $k // nilai kurvatur lingkaran dengan menggunakan definis
```

Untuk representasi parametrik umum, misalkan

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

merupakan persamaan parametrik untuk kurva bidang yang terdiferensialkan dua kali. Kurvatur untuk kurva tersebut didefinisikan sebagai

$$\kappa = \frac{d\phi}{ds} = \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \quad (\phi \text{ adalah sudut kemiringan garis singgung dan } s \text{ adalah panjang kurva)}$$

$$= \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}} = \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}$$

Selanjutnya, pembilang pada persamaan di atas dapat dicari sebagai berikut.

$$\sec^2 \phi \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} (\tan \phi) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy/dt}{dx/dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{\sec^2 \phi} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2}$$

$$= \frac{1}{1 + \tan^2 \phi} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2}$$

$$= \frac{1}{1 + \left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)^2} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2}$$

$$= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

Jadi, rumus kurvatur untuk kurva parametrik

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

adalah

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}$$

Jika kurvanya dinyatakan dengan persamaan parametrik pada koordinat kutub

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta,$$

maka rumus kurvturnya adalah

$$\kappa(\theta) = \frac{r(\theta)^2 + 2r'(\theta)^2 - r(\theta)r''(\theta)}{(r'(\theta)^2 + r(\theta)^2)^{3/2}}$$

(Silakan Anda turunkan rumus tersebut!)

Contoh:

Lingkaran dengan pusat (0,0) dan jari-jari r dapat dinyatakan dengan persamaan parametrik

$$x = r \cos t, \quad y = r \sin t.$$

Nilai kelengkungan lingkaran tersebut adalah

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}} = \frac{r^2}{r^3} = \frac{1}{r}$$

Hasil cocok dengan definisi kurvatur suatu kelengkungan.

Kurva

$$y = f(x)$$

dapat dinyatakan ke dalam persamaan parametrik

$$x = t, \quad y = f(t), \quad \text{dengan } x'(t) = 1, \quad x''(t) = 0,$$

sehingga kurvturnya adalah

$$\kappa(t) = \frac{y''(t)}{(1 + y'(t)^2)^{3/2}}$$

Contoh:

Akan ditentukan kurvatur parabola

$$y = ax^2 + bx + c.$$

```
>function f(x) &= a*x^2+b*x+c; $y=f(x)
>function k(x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) // kelengkungan parabola
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... (x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) ...
```

```
>function f(x) &= x^2+x+1; $y=f(x) // akan kita plot kelengkungan parabola untuk a=b=c=1
>function k(x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) // kelengkungan parabola
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... (x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) ...
```

Berikut kita gambar parabola tersebut beserta kurva kelengkungan, kurva jari-jari kelengkungan dan salah satu lingkaran oskulasi di titik puncak parabola. Perhatikan, puncak parabola dan jari-jari lingkaran oskulasi di puncak parabola adalah

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), \frac{1}{k(2)} = \frac{1}{2},$$

sehingga pusat lingkaran oskulasi adalah $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$.

```
>plot2d(["f(x)", "k(x)"], -2, 1, color=[blue, red]); plot2d("1/k(x)", -1.5, 1, color=green, >add); ...
plot2d("5/4+1/k(-1/2)*cos(x)", "5/4+1/k(-1/2)*sin(x)", xmin=0, xmax=2pi, >add, color=blue):
```

Error : f(x) does not produce a real or column vector

Error generated by error() command

```
%ploteval:
error(f$|) does not produce a real or column vector";
adaptiveevalone:
s=%ploteval(g$, t, args());
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
dw/n, dw/n^2, dw/n, auto; args();
```

Untuk kurva yang dinyatakan dengan fungsi implisit

$$F(x, y) = 0$$

dengan turunan-turunan parsial

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, F_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right), F_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right), F_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right),$$

berlaku

$$F_x dx + F_y dy = 0 \text{ atau } \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y},$$

sehingga kurvaturnya adalah

$$\kappa = \frac{F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy}}{(F_x^2 + F_y^2)^{3/2}}.$$

(Silakan Anda turunkan sendiri!)

Contoh 1:
Parabola

$$y = ax^2 + bx + c$$

dapat dinyatakan ke dalam persamaan implisit

$$ax^2 + bx + c - y = 0.$$

```
>function F(x,y) &=a*x^2+b*x+c-y; $F(x,y)
>Fx &= diff(F(x,y),x), Fxx &=diff(F(x,y),x,2), Fy &=diff(F(x,y),y), Fxy &=diff(diff(F(x,y),x),y), Fyy &=diff(F
```

Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexpl
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
Fx &= diff(F(x,y),x), Fxx &=diff(F(x,y),x,2), Fy &=diff(F(x,y) ...

```
>function k(x) &= (Fy^2*Fxx-2*Fx*Fy*Fxy+Fx^2*Fyy)/(Fx^2+Fy^2)^(3/2); $k(x)=k(x) // kurvatur parabola tersebut
```

Hasilnya sama dengan sebelumnya yang menggunakan persamaan parabola biasa.

Latihan

- Bukalah buku Kalkulus.
- Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi).
- Untuk setiap fungsi, tentukan anti turunannya (jika ada), hitunglah integral tentu dengan batas-batas yang menarik (Anda tentukan sendiri), seperti contoh-contoh tersebut.
- Lakukan hal yang sama untuk fungsi-fungsi yang tidak dapat diintegrasikan (cari sedikitnya 3 fungsi).
- Gambar grafik fungsi dan daerah integrasinya pada sumbu koordinat yang sama.
- Gunakan integral tentu untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan di dua titik. (Cari dan gambar kedua kurva dan arsir (warnai) daerah yang dibatasi oleh keduanya.)
- Gunakan integral tentu untuk menghitung volume benda putar kurva $y = f(x)$ yang diputar mengelilingi sumbu x dari $x=a$ sampai $x=b$, yakni

$$V = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx.$$

(Pilih fungsinya dan gambar kurva dan benda putar yang dihasilkan. Anda dapat mencari contoh-contoh bagaimana cara menggambar benda hasil perputaran suatu kurva.)

- Gunakan integral tentu untuk menghitung panjang kurva $y=f(x)$ dari $x=a$ sampai $x=b$ dengan menggunakan rumus:

$$S = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

(Pilih fungsi dan gambar kurvanya.)

- Apabila fungsi dinyatakan dalam koordinat kutub $x=f(r,t)$, $y=g(r,t)$, $r=h(t)$, $x=a$ bersesuaian dengan $t=t_0$ dan $x=b$ bersesuaian dengan $t=t_1$, maka rumus di atas akan menjadi:

$$S = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

- Pilih beberapa kurva menarik (selain lingkaran dan parabola) dari buku kalkulus. Nyatakan setiap kurva tersebut dalam bentuk: a. koordinat Kartesius (persamaan $y=f(x)$) b. koordinat kutub ($r=r(\theta)$) c. persamaan parametrik $x=x(t)$, $y=y(t)$ d. persamaan implisit $F(x,y)=0$
- Tentukan kurvatur masing-masing kurva dengan menggunakan keempat representasi tersebut (hasilnya harus sama).
- Gambarlah kurva asli, kurva kurvatur, kurva jari-jari lingkaran oskulasi, dan salah satu lingkaran oskulasinya.

Barisan dan Deret

(Catatan: bagian ini belum lengkap. Anda dapat membaca contoh-contoh penggunaan EMT dan Maxima untuk menghitung limit barisan, rumus jumlah parsial suatu deret, jumlah tak hingga suatu deret konvergen, dan sebagainya. Anda dapat mengeksplor contoh-contoh di EMT atau perbagai panduan penggunaan Maxima di software Maxima atau dari Internet.)

Barisan dapat didefinisikan dengan beberapa cara di dalam EMT, di antaranya:

- dengan cara yang sama seperti mendefinisikan vektor dengan elemen-elemen beraturan (menggunakan titik dua ";");
- menggunakan perintah "sequence" dan rumus barisan (suku ke -n);
- menggunakan perintah "iterate" atau "niterate";
- menggunakan fungsi Maxima "create_list" atau "makelist" untuk menghasilkan barisan simbolik;
- menggunakan fungsi biasa yang inputnya vektor atau barisan;
- menggunakan fungsi rekursif.

EMT menyediakan beberapa perintah (fungsi) terkait barisan, yakni:

- sum: menghitung jumlah semua elemen suatu barisan
- cumsum: jumlah kumulatif suatu barisan
- differences: selisih antar elemen-elemen berturut-turut

EMT juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah deret berhingga maupun deret tak hingga, dengan menggunakan perintah (fungsi) "sum". Perhitungan dapat dilakukan secara numerik maupun simbolik dan eksak.

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan barisan dan deret menggunakan EMT.

```
>1:10 // barisan sederhana
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
>1:2:30
```

```
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29]
```

Iterasi dan Barisan

EMT menyediakan fungsi `iterate("g(x)", x0, n)` untuk melakukan iterasi

$$x_{k+1} = g(x_k), \quad x_0 = x_0, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Berikut ini disajikan contoh-contoh penggunaan iterasi dan rekursi dengan EMT. Contoh pertama menunjukkan pertumbuhan dari nilai awal 1000 dengan laju pertumbuhan 5%, selama 10 periode.

```
>q=1.05; iterate("x*q",1000,n=10)'
```

```
1000
1050
1102.5
1157.63
1215.51
1276.28
1340.1
1407.1
1477.46
1551.33
1628.89
```

Contoh berikutnya memperlihatkan bahaya menabung di bank pada masa sekarang! Dengan bunga tabungan sebesar 6% per tahun atau 0.5% per bulan dipotong pajak 20%, dan biaya administrasi 10000 per bulan, tabungan sebesar 1 juta tanpa diambil selama sekitar 10 tahunan akan habis diambil oleh bank!

```
>r=0.005; plot2d(iterate("(1+0.8*r)*x-10000",1000000,n=130)):
```

Silakan Anda coba-coba, dengan tabungan minimal berapa agar tidak akan habis diambil oleh bank dengan ketentuan bunga dan biaya administrasi seperti di atas.

Berikut adalah perhitungan minimal tabungan agar aman di bank dengan bunga sebesar r dan biaya administrasi a , pajak bunga 20%.

```
>$solve(0.8*r*A-a,A), $% with [r=0.005, a=10]
```

Berikut didefinisikan fungsi untuk menghitung saldo tabungan, kemudian dilakukan iterasi.

```
>function saldo(x,r,a) := round((1+0.8*r)*x-a,2);
>iterate({"saldo",0.005,10},1000,n=6)

[1000, 994, 987.98, 981.93, 975.86, 969.76, 963.64]
```

```
>iterate({"saldo",0.005,10},2000,n=6)

[2000, 1998, 1995.99, 1993.97, 1991.95, 1989.92, 1987.88]
```

```
>iterate({"saldo",0.005,10},2500,n=6)

[2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500]
```

Tabungan senilai 2,5 juta akan aman dan tidak akan berubah nilai (jika tidak ada penarikan), sedangkan jika tabungan awal kurang dari 2,5 juta, lama kelamaan akan berkurang meskipun tidak pernah dilakukan penarikan uang tabungan.

```
>iterate({"saldo",0.005,10},3000,n=6)

[3000, 3002, 3004.01, 3006.03, 3008.05, 3010.08, 3012.12]
```

Tabungan yang lebih dari 2,5 juta baru akan bertambah jika tidak ada penarikan.

Untuk barisan yang lebih kompleks dapat digunakan fungsi "sequence()". Fungsi ini menghitung nilai-nilai $x[n]$ dari semua nilai sebelumnya, $x[1] \dots x[n-1]$ yang diketahui. Berikut adalah contoh barisan Fibonacci.

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 1$$

```
>sequence("x[n-1]+x[n-2]", [1,1],15)

[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]
```

Barisan Fibonacci memiliki banyak sifat menarik, salah satunya adalah akar pangkat ke-n suku ke-n akan konvergen ke pecahan emas:

```
>$'(1+sqrt(5))/2=float((1+sqrt(5))/2)
>plot2d(sequence("x[n-1]+x[n-2]", [1,1],250)^(1/(1:250))):
```

Barisan yang sama juga dapat dihasilkan dengan menggunakan loop.

```
>x=ones(500); for k=3 to 500; x[k]=x[k-1]+x[k-2]; end;
```

Rekursi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang tergantung pada semua elemen sebelumnya. Pada contoh berikut, elemen ke-n merupakan jumlah (n-1) elemen sebelumnya, dimulai dengan 1 (elemen ke-1). Jelas, nilai elemen ke-n adalah $2^{(n-2)}$, untuk $n=2, 4, 5, \dots$

```
>sequence("sum(x)", [1,1],10)

[1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
```

Selain menggunakan ekspresi dalam x dan n, kita juga dapat menggunakan fungsi.

Pada contoh berikut, digunakan iterasi

dengan A suatu matriks 2x2, dan setiap $x[n]$ merupakan matriks/vektor 2x1.

```
>A=[1,1;1,2]; function suku(x,n) := A.x[,n-1]
>sequence("suku", [1;1],6)
```

Real 2 x 6 matrix

1	2	5	13	...
1	3	8	21	...

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi perpangkatan matriks "matrixpower()". Cara ini lebih cepat, karena hanya menggunakan perkalian matriks sebanyak $\log_2(n)$.

```
>sequence("matrixpower(A,n) . [1;1]", [1,1],6)
```

Real 2 x 6 matrix

1	5	13	34	...
1	8	21	55	...

Spiral Theodorus

image: Spiral_of_Theodorus.png

Spiral Theodorus (spiral segitiga siku-siku) dapat digambar secara rekursif. Rumus rekursifnya adalah:

$$x_n = \left(1 + \frac{i}{\sqrt{n-1}}\right) x_{n-1}, \quad x_1 = 1,$$

yang menghasilkan barisan bilangan kompleks.

```
>function g(n) := 1+I/sqrt(n)
```

Rekursinya dapat dijalankan sebanyak 17 untuk menghasilkan barisan 17 bilangan kompleks, kemudian digambar bilangan-bilangan kompleksnya.

```
>x=sequence("g(n-1)*x[n-1]",1,17); plot2d(x,r=3.5); textbox(latex("Spiral\ Theodorus"),0.4):
```

Selanjutnya dihubungkan titik 0 dengan titik-titik kompleks tersebut menggunakan loop.

```
>for i=1:cols(x); plot2d([0,x[i]],>add); end:  
>
```

Spiral tersebut juga dapat didefinisikan menggunakan fungsi rekursif, yang tidak memerlukan indeks dan bilangan kompleks. Dalam hal ini digunakan vektor kolom pada bidang.

```
>function gstep(v) ...  
w=[-v[2];v[1]];  
return v+w/norm(w);  
endfunction
```

Jika dilakukan iterasi 16 kali dimulai dari [1;0] akan didapatkan matriks yang memuat vektor-vektor dari setiap iterasi.

```
>x=iterate("gstep",[1;0],16); plot2d(x[1],x[2],r=3.5,>points):
```

Kekonvergenan

Terkadang kita ingin melakukan iterasi sampai konvergen. Apabila iterasinya tidak konvergen setelah ditunggu lama, Anda dapat menghentikannya dengan menekan tombol [ESC].

```
>iterate("cos(x)",1) // iterasi x(n+1)=cos(x(n)), dengan x(0)=1.
```

```
0.739085133216
```

Iterasi tersebut konvergen ke penyelesaian persamaan

$$x = \cos(x).$$

Iterasi ini juga dapat dilakukan pada interval, hasilnya adalah barisan interval yang memuat akar tersebut.

```
>hasil := iterate("cos(x)",~1,2~) //iterasi x(n+1)=cos(x(n)), dengan interval awal (1, 2)
```

```
~0.739085133211,0.7390851332133~
```

Jika interval hasil tersebut sedikit diperlebar, akan terlihat bahwa interval tersebut memuat akar persamaan $x=\cos(x)$.

```
>h=expand(hasil,100), cos(h) << h
```

```
~0.73908513309,0.73908513333~  
1
```

Iterasi juga dapat digunakan pada fungsi yang didefinisikan.

```
>function f(x) := (x+2/x)/2
```

Iterasi $x(n+1)=f(x(n))$ akan konvergen ke akar kuadrat 2.

```
>iterate("f",2), sqrt(2)
```

```
1.41421356237  
1.41421356237
```

Jika pada perintah `iterate` diberikan tambahan parameter n , maka hasil iterasinya akan ditampilkan mulai dari iterasi pertama sampai ke- n .

```
>iterate("f",2,5)
```

```
[2, 1.5, 1.41667, 1.41422, 1.41421, 1.41421]
```

Untuk iterasi ini tidak dapat dilakukan terhadap interval.

```
>niterate("f",~1,2~,5)
```

```
[ ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~ ]
```

Perhatikan, hasil iterasinya sama dengan interval awal. Alasannya adalah perhitungan dengan interval bersifat terlalu longgar. Untuk meningkatkan perhitungan pada ekspresi dapat digunakan pembagian intervalnya, menggunakan fungsi `ieval()`.

```
>function s(x) := ieval("(x+2/x)/2",x,10)
```

Selanjutnya dapat dilakukan iterasi hingga diperoleh hasil optimal, dan intervalnya tidak semakin mengecil. Hasilnya berupa interval yang memuat akar persamaan:

$$x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$$

Satu-satunya solusi adalah

$$x = \sqrt{2}$$

```
>iterate("s",~1,2~)
```

```
~1.41421356236,1.41421356239~
```

Fungsi "iterate()" juga dapat bekerja pada vektor. Berikut adalah contoh fungsi vektor, yang menghasilkan rata-rata aritmetika dan rata-rata geometri.

$$(a_{n+1}, b_{n+1}) = \left(\frac{a_n + b_n}{2}, \sqrt{a_n b_n} \right)$$

Iterasi ke-n disimpan pada vektor kolom x[n].

```
>function g(x) := [(x[1]+x[2])/2;sqrt(x[1]*x[2])]
```

Iterasi dengan menggunakan fungsi tersebut akan konvergen ke rata-rata aritmetika dan geometri dari nilai-nilai awal.

```
>iterate("g", [1;5])
```

```
2.60401  
2.60401
```

Hasil tersebut konvergen agak cepat, seperti kita cek sebagai berikut.

```
>iterate("g", [1;5],4)
```

```
1          3          2.61803          2.60403          2.60401  
5          2.23607          2.59002          2.60399          2.60401
```

Iterasi pada interval dapat dilakukan dan stabil, namun tidak menunjukkan bahwa limitnya pada batas-batas yang dihitung.

```
>iterate("g", [~1~;~5~],4)
```

```
Interval 2 x 5 matrix  
~0.9999999999999999778,1.000000000000000022~ ...  
~4.99999999999999911,5.000000000000000089~ ...
```

Iterasi berikut konvergen sangat lambat.

```
>iterate("sqrt(x)",2,10)
```

```
[2, 1.41421, 1.18921, 1.09051, 1.04427, 1.0219, 1.01089, 1.00543, 1.00271, 1.00135,  
1.00068]
```

Kekonvergenan iterasi tersebut dapat dipercepat dengan percepatan Steffenson:

```
>steffenson("sqrt(x)",2,10)
```

```
[1.04888, 1.00028, 1, 1]
```

Iterasi menggunakan Loop yang ditulis Langsung

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan loop untuk melakukan iterasi yang ditulis langsung pada baris perintah.

```
>x=2; repeat x=(x+2/x)/2; until x^2~2; end; x,
```

```
1.41421356237
```

Penggabungan matriks menggunakan tanda "|" dapat digunakan untuk menyimpan semua hasil iterasi.

```
>v=[1]; for i=2 to 8; v=v|(v[i-1]*i); end; v,
```

```
[1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320]
```

hasil iterasi juga dapat disimpan pada vektor yang sudah ada.

```
>v=ones(1,100); for i=2 to cols(v); v[i]=v[i-1]*i; end; ...
plot2d(v,logplot=1); textbox(latex(&log(n)),x=0.5):
>A=[0.5,0.2;0.7,0.1]; b=[2;2]; ...
x=[1;1]; repeat xnew=A.x-b; until all(xnew~=x); x=xnew; end; ...
x,

-7.09677
-7.74194
```

Iterasi di dalam Fungsi

Fungsi atau program juga dapat menggunakan iterasi dan dapat digunakan untuk melakukan iterasi. Berikut adalah beberapa contoh iterasi di dalam fungsi.

Contoh berikut adalah suatu fungsi untuk menghitung berapa lama suatu iterasi konvergen. Nilai fungsi tersebut adalah hasil akhir iterasi dan banyak iterasi sampai konvergen.

```
>function map hiter(f$,x0) ...
x=x0;
maxiter=0;
repeat
xnew=f$(x);
maxiter=maxiter+1;
until xnew~=x;
x=xnew;
end;
return maxiter;
endfunction
```

Misalnya, berikut adalah iterasi untuk mendapatkan hampiran akar kuadrat 2, cukup cepat, konvergen pada iterasi ke-5, jika dimulai dari hampiran awal 2.

```
>hiter("(x+2/x)/2",2)

5
```

Karena fungsinya didefinisikan menggunakan "map", maka nilai awalnya dapat berupa vektor.

```
>x=1.5:0.1:10; hasil=hiter("(x+2/x)/2",x); ...
plot2d(x,hasil):

Function hiter not found.
Try list ... to find functions!
Error in:
x=1.5:0.1:10; hasil=hiter("(x+2/x)/2",x); plot2d(x,hasil): ...
^
```

Dari gambar di atas terlihat bahwa kekonvergenan iterasinya semakin lambat, untuk nilai awal semakin besar, namun penambahannya tidak kontinu. Kita dapat menemukan kapan maksimum iterasinya bertambah.

```
>hasil[1:10]

[4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6]

>x[nonzeros(differences(hasil))]

[1.5, 2, 3.4, 6.6]
```

maksimum iterasi sampai konvergen meningkat pada saat nilai awalnya 1.5, 2, 3.4, dan 6.6.

Contoh berikutnya adalah metode Newton pada polinomial kompleks berderajat 3.

```
>p &= x^3-1; newton &= x-p/diff(p,x); $newton

Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
p &= x^3-1; newton &= x-p/diff(p,x); $newton ...
^
```

Selanjutnya didefinisikan fungsi untuk melakukan iterasi (aslinya 10 kali).

```
>function iterasi(f$,x,n=10) ...
loop 1 to n; x=f$(x); end;
return x;
endfunction
```

Kita mulai dengan menentukan titik-titik grid pada bidang kompleksnya.

```
>r=1.5; x=linspace(-r,r,501); Z=x+I*x'; W=iterasi(newton,Z);

Function newton needs at least 3 arguments!
Use: newton (f$: call, df$: call, x: scalar complex {, y: number, eps: none})
```

```
Error in:
... x=linspace(-r,r,501); Z=x+I*x'; W=iterasi(newton,Z); ...
      ^
```

Berikut adalah akar-akar polinomial di atas.

```
>z=solve(p)()
```

```
[ -0.5+0.866025i, -0.5-0.866025i, 1+0i ]
```

Untuk menggambar hasil iterasinya, dihitung jarak dari hasil iterasi ke-10 ke masing-masing akar, kemudian digunakan untuk menghitung warna yang akan digambar, yang menunjukkan limit untuk masing-masing nilai awal.

Fungsi plotrgb() menggunakan jendela gambar terkini untuk menggambar warna RGB sebagai matriks.

```
>C=rgb(max(abs(W-z[1]),1),max(abs(W-z[2]),1),max(abs(W-z[3]),1)); ...
plot2d(none,-r,r,-r,r); plotrgb(C):
```

```
Variable W not found!
Error in:
C=rgb(max(abs(W-z[1]),1),max(abs(W-z[2]),1),max(abs(W-z[3]),1) ...
      ^
```

Iterasi Simbolik

Seperti sudah dibahas sebelumnya, untuk menghasilkan barisan ekspresi simbolik dengan Maxima dapat digunakan fungsi makelist().

```
>&powerdisp:true // untuk menampilkan deret pangkat mulai dari suku berpangkat terkecil
```

```
true
```

```
>deret =& makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,1,3); $deret // barisan deret Taylor untuk e^x
```

```
Maxima said:
taylor: 0.1539740213994798*r cannot be a variable.
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:
deret =& makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,1,3); $deret // baris ...
      ^
```

Untuk mengubah barisan deret tersebut menjadi vektor string di EMT digunakan fungsi mxm2str(). Selanjutnya, vektor string/ekspresi hasilnya dapat digambar seperti menggambar vektor ekspresi pada EMT.

```
>plot2d("exp(x)",0,3); // plot fungsi aslinya, e^x
>plot2d(mxm2str("deret"),>add,color=4:6): // plot ketiga deret taylor hampiran fungsi tersebut
```

```
Maxima said:
length: argument cannot be a symbol; found deret
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
mxmeval:
return evaluate(mxm(s));
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
mxm2str:
n=mxmeval("length(VVV)");
```

Selain cara di atas dapat juga dengan cara menggunakan indeks pada vektor/list yang dihasilkan.

```
>$deret[3]
>plot2d(["exp(x)",&deret[1],&deret[2],&deret[3]],0,3,color=1:4):
```

```
deret is not a variable!
Error in expression: deret[1]
%ploteval:
y0=f$(x[1],args());
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
u=u_(%ploteval(xx[#],t,args()));
```

```
>$sum(sin(k*x)/k,k,1,5)
```

Berikut adalah cara menggambar kurva

$$y = \sin(x) + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots$$

```
>plot2d(&sum(sin((2*k+1)*x)/(2*k+1),k,0,20),0,2pi):
```

```
Maxima output too long!
Error in:
```

```
plot2d(&sum(sin((2*k+1)*x)/(2*k+1),k,0,20),0,2pi): ...
```

Hal serupa juga dapat dilakukan dengan menggunakan matriks, misalkan kita akan menggambar kurva

$$y = \sum_{k=1}^{100} \frac{\sin(kx)}{k}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

```
>x=linspace(0,2pi,1000); k=1:100; y=sum(sin(k*x')/k)'; plot2d(x,y):
```

Tabel Fungsi

Terdapat cara menarik untuk menghasilkan barisan dengan ekspresi Maxima. Perintah `mxmtable()` berguna untuk menampilkan dan menggambar barisan dan menghasilkan barisan sebagai vektor kolom.

Sebagai contoh berikut adalah barisan turunan ke-n x^n di $x=1$.

```
>mxmtable("diffat(x^x,x=1,n)","n",1,8,frac=1);
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
#0: diffat(expr=[0,1.66665833335744e-7*r,1.33330666692022e-6*r,4.499797504338432e-6*r,1.066581336583994e-6*r,1.066581336583994e-6*r,1.066581336583994e-6*r,1.066581336583994e-6*r],var=x,x=1,n)
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

%mxmevtable:
return mxm("@expr,@var=@value")();
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
mxmtable:
y[#,1]=%mxmevtable(expr,var,x[#]);
```

```
>$'sum(k, k, 1, n) = factor(ev(sum(k, k, 1, n),simpsum=true)) // simpsum:menghitung deret secara simbolik
>$'sum(1/(3^k+k), k, 0, inf) = factor(ev(sum(1/(3^k+k), k, 0, inf),simpsum=true))
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung.

```
>$'sum(1/x^2, x, 1, inf) = ev(sum(1/x^2, x, 1, inf),simpsum=true) // ev: menghitung nilai ekspresi
>$'sum((-1)^(k-1)/k, k, 1, inf) = factor(ev(sum((-1)^(x-1)/x, x, 1, inf),simpsum=true))
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung.

```
>$'sum((-1)^k/(2*k-1), k, 1, inf) = factor(ev(sum((-1)^k/(2*k-1), k, 1, inf),simpsum=true))
>$ev(sum(1/n!, n, 0, inf),simpsum=true)
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung, harusnya hasilnya e.

```
>&assume(abs(x)<1); $'sum(a*x^k, k, 0, inf)=ev(sum(a*x^k, k, 0, inf),simpsum=true), &forget(abs(x)<1);
```

```
Answering "Is -94914474571+15819*r positive, negative or zero?" with "positive"
Maxima said:
sum: sum is divergent.
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... k, 0, inf)=ev(sum(a*x^k, k, 0, inf),simpsum=true), &forget(abs ...
```

Deret geometri tak hingga, dengan asumsi rasional antara -1 dan 1.

```
>$'sum(x^k/k!,k,0,inf)=ev(sum(x^k/k!,k,0,inf),simpsum=true)
>$limit(sum(x^k/k!,k,0,n),n,inf)
>function d(n) &= sum(1/(k^2-k),k,2,n); $'d(n)=d(n)
>$d(10)=ev(d(10),simpsum=true)
>$d(100)=ev(d(100),simpsum=true)
```

Barisan dan Deret

Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau karakteristik tertentu, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari anggota-anggota dalam barisan tertentu.

Barisan dapat didefinisikan dengan beberapa cara di dalam EMT, di antaranya:

- dengan cara yang sama seperti mendefinisikan vektor dengan elemen-elemen beraturan (menggunakan titik dua ":");
- menggunakan perintah "sequence" dan rumus barisan (suku ke -n);
- menggunakan perintah "iterate" atau "niterate";
- menggunakan fungsi Maxima "create_list" atau "makelist" untuk menghasilkan barisan simbolik;
- menggunakan fungsi biasa yang inputnya vektor atau barisan;
- menggunakan fungsi rekursif.

EMT menyediakan beberapa perintah (fungsi) terkait barisan, yakni:

- `sum`: menghitung jumlah semua elemen suatu barisan
- `cumsum`: jumlah kumulatif suatu barisan
- `differences`: selisih antar elemen-elemen berturut-turut

Contoh:

```
>5:15
```

```
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
```

```
>1:3:10
```

```
[1, 4, 7, 10]
```

```
>sum(1:3:10)
```

```
22
```

Rumus deret berhingga

Diberikan deret sederhana sebagai berikut

```
>A := [2, 4, 8, 16, 32]
```

```
[2, 4, 8, 16, 32]
```

```
#Menentukan suku ke-n
```

Contoh:

Tentukanlah suku ke-7 dari deret tersebut
Dengan $a=2$ dan $r=2$

```
>n=7; a=2; r=2; a*r^(n-1)
```

```
128
```

```
#Menghitung Jumlah deret suku ke-n
```

jika konvergen, $r > 1$
atau

jika divergen, $r < 1$

Contoh:

Hitunglah jumlah deret A pada suku ke-5
Dengan $a=2$ dan $r=2$

```
>n=5; a=2; r=2; a*((r^n)-1)/(r-1)
```

```
62
```

```
>sum(A := [2, 4, 8, 16, 32])
```

```
62
```

Rumus Deret Tak Hingga

```
#Menghitung jumlah suku tak hingga konvergen  
Untuk  $-1 < r < 1$ , maka
```

```
Memiliki limit jumlah
```

```
dengan
```

Contoh:

```
>a=12; r=1/2; a/(1-r)
```

```
24
```

Limit Barisan

Limit barisan melambangkan nilai mutlak untuk bilangan riil dan nilai modulus untuk bilangan kompleks.
Definisi formal:

Dapat dinotasikan sebagai

Contoh:

1.

```
>$showev('limit(1/n,n,inf))
```

2.


```
>$showev('limit((2*n^2-1)/(n^2+5),n,inf))
```

Kekonvergenan

Barisan yang konvergen adalah barisan yang terbatas.
Jika (X_n) konvergen, maka (X_n) terbatas.

Kita dapat menggunakan fungsi iterate ("g(x)", x0, n) untuk melakukan iterasi

Contoh:

```
>iterate("cos(x)",1) // iterasi x(n+1)=cos(x(n)), dengan x(0)=1.
```

```
0.739085133216
```

Iterasi tersebut konvergen ke penyelesaian persamaan

Iterasi ini juga dapat dilakukan pada interval, hasilnya adalah barisan interval yang memuat akar tersebut.

```
>hasil := iterate("cos(x)",~2,3~) //interval awal (2,3)
```

```
~0.7390851332143,0.7390851332161~
```

Jika interval hasil tersebut sedikit diperlebar, akan terlihat bahwa interval tersebut memuat akar persamaan $x=\cos(x)$.

```
>h=expand(hasil,100), cos(h) << h
```

```
~0.73908513313,0.7390851333~  
1
```

Iterasi juga dapat digunakan pada fungsi yang didefinisikan.

```
>function f(x) := (x+4/x)/4
```

Iterasi $x(n+1)=f(x(n))$ akan konvergen ke akar kuadrat 4.

```
>iterate("f",4), sqrt(4)
```

```
1.15470053838  
2
```

Kita juga dapat menggunakan fungsi "sequence()" untuk barisan yang kompleks. Fungsi ini menghitung nilai-nilai $x[n]$ dari semua nilai sebelumnya, $x[1], \dots, x[n-1]$ yang diketahui. Berikut adalah contoh barisan Fibonacci.

```
>sequence("x[n-1]+x[n-2]", [2,3],10)
```

```
[2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144]
```

Kemudian kita dapat menggunakan fungsi makelist() untuk menghasilkan barisan ekspresi simbolik dengan maxima.

```
>&powerdisp:true
```

```
true
```

perintah tersebut untuk menampilkan deret pangkat mulai dari suku berpangkat terkecil

```
>deret &= makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,2,4); $deret
```

Deret Taylor

Deret Taylor suatu fungsi f yang diferensiabel sampai tak hingga di sekitar $x=a$ adalah:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-a)^k f^{(k)}(a)}{k!}.$$

```
>$'e^x =taylor(exp(x),x,0,10) // deret Taylor e^x di sekitar x=0, sampai suku ke-11
```

```
Maxima said:  
taylor: 0.1539740213994798*r cannot be a variable.  
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:  
$'e^x =taylor(exp(x),x,0,10) // deret Taylor e^x di sekitar x= ...  
^
```

```
>$'log(x)=taylor(log(x),x,1,10)// deret log(x) di sekitar x=1
```

$$\log x = x - \frac{(x-1)^{10}}{10} + \frac{(x-1)^9}{9} - \frac{(x-1)^8}{8} + \frac{(x-1)^7}{7} - \frac{(x-1)^6}{6} + \frac{(x-1)^5}{5} - \frac{(x-1)^4}{4} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^2}{2} - 1$$

FUNGSI MULTIVARIABEL fungsi multivariabel adalah pemetaan matematis yang menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Fungsi ini umumnya dinotasikan sebagai

Fungsi multivariabel dapat diwakili dalam bentuk peta atau grafik tiga dimensi.
Contoh fungsi multivariabel :

Dimana variabel bebasnya yaitu x dan y.
Grafik Fungsi Multivariabel Pada fungsi multivariabel, grafik fungsinya merupakan grafik tiga dimensi. Ruang dimensi tiga dilambangkan dengan

Permukaan dalam R^3 terdapat dua macam yakni permukaan linear dan kuadratik. Setiap permukaan linear berupa bidang datar, sedangkan permukaan kuadratik berupa bidang lengkung yang kelengkungannya bergantung atas bentuk persamaannya.
Untuk membuat grafik fungsi tiga dimensi, maka kita dapat menggunakan perintah "plot3d()"

Grafik Fungsi Persamaan Linear Dalam Dimensi Tiga

Bentuk umum persamaan permukaan linear adalah

Contoh grafik persamaan linear di ruang tiga dimensi:

```
>plot3d("x-2") :  
>plot3d("2*x+6*y-18") :  
>plot3d("5*x-2") :  
>plot3d("2*x+8*y+4*z-18", implicit=3, r=5) :
```

Grafik Fungsi Kuadratik di Ruang Dimensi Tiga

Persamaan kuadratik mempunyai rumus umum :

Permukaan-permukaan kuadratik dapat berupa permukaan bola, ellipsoida, paraboloida, tabung ellips, tabung lingkaran, atau tabung parabola.
Contoh grafik fungsi kuadratik di ruang dimensi tiga:

```
>plot3d("2*x^2+4*y^2") :  
>function f(x,y) := exp(-(2*x^2+4*y^2))  
>plot3d("f", r=5) :  
>plot3d("9*x^2+4*y^2+9*z^2-36", implicit=2, r=3) :
```

Gambar diatas merupakan ellipsoid yang persamaannya biasa dinyatakan dalam

Sedangkan grafik diatas merupakan ellipsoid dengan persamaan :

Namun, untuk memudahkan dalam memplotnya kita hilangkan bentuk pecahannya dengan mengurangi kedua ruas dengan satu lalu mengalikannya dengan 36 sehingga diperoleh $9x^2+4y^2+9z^2-36=0$

```
>plot3d("y^2-x^2", r=2) :
```

Gambar diatas merupakan paraboloida hiperbolik

```
>plot3d("x^2/y") :
```

Menggambar kurva perpotongan dari dua persamaan

Di EMT kita juga dapat menggabungkan dua kurva pada satu bidang untuk menggambarkan perpotongan. Untuk masalah ini kita gunakan fungsi

dalam prosesnya.
Contoh :

```
>plot3d("x^2+y^2+z-4", r=5, implicit=3);  
>plot3d("x^2+y^2-1", implicit=3, r=5, >add) :
```

Dari persamaan diatas, kita dapatkan perpotongan antara paraboloida dengan tabung lingkaran.
2.

```
>plot3d("x^2+y^2+2z-9", r=5, implicit=3);  
>plot3d("y-1", r=5, implicit=3, >add) :
```

Dari persamaan diatas, didapatkan perpotongan antara bidang datar dan bidang lengkung.
3.

```
>plot3d("x^2+y^2-4",r=5,implicit=3); plot3d("y^2+z^2-4",r=5,implicit=3,>add):
```

Didapatkan perpotongan antara dua tabung lingkaran.

Turunan Fungsi Multivariabel

Turunan Fungsi Dua Variabel

Turunan parsial, yaitu turunan fungsi terhadap satu variabel bebas sementara variabel bebas lainnya dianggap tetap atau konstan.

- Turunan Parsial terhadap f terhadap x di (x_0,y_0)

- Turunan Parsial f terhadap y di (x_0,y_0) $f_y(x_0,y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$

Contoh soal untuk turunan parsial :

1.

```
>z = 2*x*y - (1-x^2)
```

$$2xy + x^2 - 1$$

```
>$showev('limit((2*(x+h)*y) - (1-(x+h)^2))/h,h,0)
```

Perhitungan akan dilakukan menggunakan diff

```
>&diff(z,x) // z akan diturunkan terhadap x
```

$$2y + 2x$$

Karena pada fungsi z terdapat $2xy$ yang merupakan perkalian, untuk menghitung turunannya kita gunakan $u'v+uv'$, sehingga turunan dari $2xy$:

Kemudian turunan dari variabel berpangkat yaitu:

$u^n = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

Jadi turunan dari x^2 :

Turunan dari konstanta adalah 0
sehingga, turunan dari fungsi

terhadap x adalah

```
>&diff(z,y) // z akan diturunkan terhadap y
```

$$2x$$

Seperti pada turunan terhadap x, kita gunakan langkah yang sama namun kita anggap x konstan.

Jadi, turunan terhadap y dari $f(x,y)$ adalah $2x$.
Sehingga, turunan parsial dari

2. Hitunglah turunan terhadap x dan terhadap y dari

```
>expr=x^2*cos(x*y); // definisikan fungsi f(x,y)
>&diff(expr,x)
```

$$2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy)$$

x disini untuk menandakan bahwa fungsi diturunkan terhadap x dan y dianggap konstan.

```
>&diff(expr,y)
```

$$-x^3 \sin(xy)$$

y menandakan bahwa fungsi diturunkan terhadap y dan x dianggap konstan.

Jadi, turunan dari fungsi

Turunan Orde Tinggi

Turunan parsial kedua meliputi :

Fungsi f diturunkan terhadap x kemudian turunan pertama diturunkan lagi terhadap x.

Fungsi f diturunkan terhadap x kemudian turunan pertamanya diturunkan lagi terhadap y.

Fungsi f diturunkan terhadap y kemudian turunan pertama diturunkan lagi terhadap y.

Fungsi f diturunkan terhadap y kemudian turunan pertama diturunkan lagi terhadap x.

Turunan parsial tingkat tiga dan lebih tinggi didefinisikan dengan cara yang sama dan cara penulisannya pun serupa. Jadi, jika suatu fungsi dua variabel x dan y, turunan parsial ketiga f yang diperoleh dengan mendiferensialkan f secara parsial, pertamakali terhadap x dan kemudian terhadap y, akan ditunjukkan oleh

Seluruhnya, terdapat delapan turunan parsial ketiga.

Contoh :

Carilah

dari fungsi berikut

```
>f &= x*E^y-sin(x/y)+x^3*y^2
```

$$x E^y + x^3 y^2 - \sin\left(\frac{x}{y}\right)$$

```
>fx &= diff(f,x) // f akan diturunkan terhadap x
```

$$E^y + 3x^2 y^2 - \frac{\cos\left(\frac{x}{y}\right)}{y}$$

```
>fxx &= diff(fx,x) // turunan pertama dari f terhadap x diturunkan lagi terhadap x
```

$$6xy^2 + \frac{\sin\left(\frac{x}{y}\right)}{y^2}$$

```
>fy &= diff(f,y) // f akan diturunkan terhadap y
```

$$x E^y + 2x^3 y + \frac{x \cos\left(\frac{x}{y}\right)}{y^2}$$

```
>fyy &= diff(fy,y) // turunan pertama dari f terhadap y diturunkan lagi terhadap y
```

$$x E^y - \frac{2x \cos\left(\frac{x}{y}\right)}{y^3} + \frac{x^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right)}{y^4} + 2x^3$$

Jadi, turunan parsial kedua fungsi f terhadap x dan y adalah

Integral Lipat Dua

Integral lipat dua f pada R, diberikan oleh

atau bisa ditulis dengan

Misalkan R adalah sebuah persegi panjang dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat; yaitu, misalkan

Urutan dx dan dy penting karena ia merinci integrasi mana yang akan dilakukan pertama.

SIFAT-SIFAT INTEGRAL LIPAT DUA:

1. Integral lipat dua bersifat linear, yaitu:
2. Integral lipat dua bersifat aditif (dapat dijumlahkan) pada persegi panjang yang saling berhimpit pada hanya sebuah ruas garis
3. Sifat perbandingan berlaku jika

CONTOH :

1. Hitung

Dengan memperhatikan urutan dx dan dy, pada soal kali ini kita hitung integralnya dari sebelah dalam yaitu kita integralkan terhadap x terlebih dahulu.

```
>qx &= integrate((2*x*y), x)
```

$$x^2 y$$

Setelah kita integralkan terhadap x, lalu hasilnya kita integralkan terhadap y.

```
>qy &= integrate(qx, y)
```

$$\frac{x^2 y^2}{2}$$

Jadi, hasil dari

adalah

2. Hitung

```
>f &= 2*x+3*y
```

$$3y + 2x$$

Dalam integral sebelah dalam, y berupa konstanta, sehingga

```
>fx &= integrate((2*x+3*y), x, 1, 2)
```

$$3y + 3$$

Setelah mencari integral terhadap x, lalu kita integralkan hasil tersebut terhadap y, akibatnya

```
>fy &= integrate((3+3*y), y, 0, 3)
```

$$\frac{45}{2}$$

Akan kita tukar urutan integrasi dari contoh 2; diharapkan jawabannya akan tetap sama seperti pada contoh 2.

3. Hitung

```
>f &= 2*x+3*y
```

$$3y + 2x$$

```
>fy &= integrate(f, y, 0, 3)
```

$$\frac{12x + 27}{2}$$

```
>fx &= integrate(fy,x,1,2)
```

```
45  
--  
2
```

Ternyata didapatkan hasil yang sama. Jadi, jika urutan pengintegrasianya dibalik, hasil akan tetap sama asalkan batas integral sesuai.
Aplikasi Fungsi Multivariabel

Penerapan Plot Kontur

Peta kontur seringkali digunakan untuk memperlihatkan kondisi cuaca atau lainnya dari berbagai titik dalam peta.

1. Buatlah plot kontur dari fungsi berikut

```
>f &= 1/2*(x^2+y^2)
```

```
2 2  
y + x  
-----  
2
```

```
>aspect(1.5);  
>plot3d(f):  
>plot2d(f, level=0:2:20, >hue, >spectral, n=200, grid=4, r=5):
```

2. Seorang ahli geologi sedang melakukan penelitian di daerah vulkanik. Dia tertarik untuk memahami bagaimana ketinggian permukaan tanah di sekitar gunung berapi berubah. Ketinggian di suatu titik (x, y) dalam kilometer di sekitar gunung berapi tersebut dapat dijelaskan oleh fungsi ketinggian H(x, y), di mana x dan y adalah koordinat dalam kilometer. Fungsi ketinggian H(x, y) diberikan oleh persamaan:

Gambarkan plot kontur dari fungsi ketinggian H(x, y) untuk memvisualisasikan perubahan ketinggian di sekitar gunung berapi dengan level ketinggian 1 sampai 7 km.

```
>h &= 3*x^2-2*y^2
```

```
2 2  
3 x - 2 y
```

```
>plot3d(h):  
>aspect(1.5);  
>plot2d(h, level=1:1:7, >hue, >spectral, n=200, grid=4, r=2):
```

Laju Perubahan

Dalam hal ini turunan parsial dapat digunakan sebagai tingkat perubahan terhadap variabel tertentu.

3. Volume suatu gas tertentu dihubungkan terhadap suhunya T dan tekanannya P menurut hukum gas PV = 10T, dengan V diukur dalam inci kubik, P dalam pon per inci kuadrat, dan T dalam derajat Kelvin. Jika V dijaga tetap konstan pada 50, berapakah laju perubahan tekanan terhadap suhu ketika T=200?
Diketahui :

Jadi, untuk mengetahui berapa laju perubahan tekanan terhadap suhu ketika T=200 dan V=50, maka perlu kita substitusikan T dan V ke P

```
>p &= (10*T)/V
```

```
10 T  
----  
V
```

```
>&diff(p,T)
```

```
10  
--  
V
```

```
>10/50
```

0.2

Jadi, tekanan bertambah lebih besar pada laju 1/5 atau 0.2 pon per inci kuadrat per derajat Kelvin.

Penerapan Integral Lipat Dua

4. Sebuah lamina dengan kerapatan

dibatasi oleh sumbu-x, garis $x=8$, dan kurva $y=x^{2/3}$. Carilah massa totalnya.
Rumus massa diberikan oleh

Jadi,

```
>my &= integrate((x*y), y, 0, x^(2/3))
```

$$\frac{7}{3}x^{\frac{5}{3}}$$

```
>mx &= integrate(my, x, 0, 8)
```


$$\frac{768}{5}$$

LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Gambarkan kurva fungsi aljabar berikut

$$3x^4 - x^3 + 2x^2 + 5$$


```
>plot2d("3x^4-x^3+2x^2+5"):
```



2. Gambarkan fungsi trigonometri berikut

$$\frac{\sin 60}{\cos 30}$$

```
>plot2d("sin(x*pi/180)/cos(x*pi/180)", 0, 60):
```



3. Carilah hasil dan gambarkan kurva fungsi eksponensial

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$$

>plot2d("2^x", 0, -50):

```
A function returned no value. Cannot assign this to a variable.
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
  dw/n, dw/n^2, dw/n, auto; args();
```

4. Carilah hasil dan gambarkan kurva fungsi logaritma

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(x) = -\infty$$

5. Carilah hasil dan gambarkan kurva komposisi fungsi

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (g(x))^2 = 1$$

6. Cari nilai dari turunan fungsi

$$g(x) = 4x^4 - 3x^3 - 2x^2 - x - 1$$

>\$showev('limit(((4*(x+h)^4-3*(x+h)^3-2*(x+h)^2-(x+h)-1)-(4*x^4-3*x^3-2*x^2-x-1))/h,h,0))

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h)^4 - 3(x+h)^3 - 2(x+h)^2 - (x+h) - 1 - (4x^4 + 3x^3 + 2x^2 - x - 1)}{h} = 16x^3 - 9x^2 - 4x - 1$$

7. Cari nilai dari turunan fungsi

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x)$$

>\$showev('limit((sin(x+h)-cos(x+h)-(sin(x)-cos(x)))/h,h,0))

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \cos(x+h) - \sin(x) + \cos(x)}{h} = \sin(x) + \cos(x)$$

8. Tentukan benar atau salah bahwa turunan dari

$$f(x) = x^2 - 2x + 1$$

adalah

$$f'(x) = 2x - 2$$

>\$showev('limit(((x+h)^2-2*(x+h)+1-(x^2-2*x+1))/h,h,0))

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2 - 2(x+h) + 2x}{h} = 2x - 2$$

9. Tentukan titik ekstrem pada

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0$$

>\$showev('limit(((x+h)^3-6*(x+h)^2+9*(x+h)+1-(x^3-6*x^2+9*x+1))/h,h,0))

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - 6(x+h)^2 - x^3 + 6x^2 + 9(x+h) - 9x}{h} = 3x^2 - 12x + 9$$

Dimana $f'(x)=0$

Kemudian bisa kita mencari akar dengan cara memfaktorkan turunan fungsi setelah disederhanakan dengan membagi fungsi dengan angka 3 menjadi:


```
>$ (factor(x^2-4*x+3))
```

didapat titik kritis adalah $x=3$ atau $x=1$

```
>function f(x) &= x^3-6*x^2+9*x+1
```

$$x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

kemudian memasukkan nilai x pada fungsi untuk mendapat nilai $f(x)$

```
>f(1)
```

5

```
>f(3)
```

1

didapat titik kritis fungsi terletak pada (1,5) dan (3,1)

10. Tentukan kedua titik pada soal no 4 apakah merupakan titik maksimum atau minimum!

```
>$showev('limit((3*(x+h)^2-12*(x+h)+9-(3*x^2-12*x+9))/h,h,0)')
```

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 - 3x^2 - 12(x+h) + 12x}{h} = 6x - 12$$

Setelah menemukan turunan kedua $f(x)$ maka kita tinggal memasukkan $x=1$ dan $x=3$ untuk mendapatkan nilai fungsi pada titik kritis.

```
>function f(x) &= 6*x-12
```

$$6x - 12$$

kemudian memasukkan nilai x pada fungsi turunan kedua

```
>f(1)
```

-6

```
>f(3)
```

6

didapat titik maksimum lokal fungsi pada titik (1,5) dan titik minimum lokal fungsi ada pada titik (3,1)

11. Integral Tak Tentu

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$\int \frac{1}{x^3} dx$$

$$\int \sqrt{3x+5} dx$$

$$\int (x^2 + 4x + 1) dx$$

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx$$

```
>$showev('integrate(1/(x^2+1),x)')
```

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x$$

```
>$showev('integrate(1/(x^3),x)')
```

$$\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2}$$

```
>$showev('integrate(sqrt(3*x+5),x)')
```

$$\int \sqrt{3x+5} dx = \frac{2(3x+5)^{\frac{3}{2}}}{9}$$

```
>$showev('integrate((x^2+4*x+1),x))
```

$$\int x^2 + 4x + 1 dx = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + x$$

```
>$showev('integrate((3*x^2-4*x+5),x))
```

$$\int 3x^2 - 4x + 5 dx = x^3 - 2x^2 + 5x$$

12. Integral Tak Tentu

maxima: 'integrate (\sqrt{x^2+4},x,1,4)

$$\int_1^4 \sqrt{x^2 + 4} dx$$

$$\int_2^5 \sqrt{x} dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

```
>$showev('integrate(sqrt(x+4),x,1,4))
```

$$\int_1^4 \sqrt{x + 4} dx = \frac{2^{11}}{3} - \frac{2 \cdot 5^{\frac{3}{2}}}{3}$$

```
>$showev('integrate(sqrt(x),x,2,5))
```

$$\int_2^5 \sqrt{x} dx = \frac{2 \cdot 5^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{2^{\frac{5}{2}}}{3}$$

```
>$showev('integrate(1/(x^2+1),x,1,3))
```

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan 3 - \frac{\pi}{4}$$

13. Diberikan kurva y

$$y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$$

Hitung panjang kurva dari x=0 sampai x=2

```
>&diff(x^3/3+2*x, x)
```

$$x^2 + 2$$

```
>$& (expand((x^2+2)^2))
```

$$x^4 + 4x^2 + 4$$

```
>function f(x):= x^4+4*x^2+4
```

```
>$showev('integrate(sqrt(1+x^4+4*x^2+4),x,0,2))
```

$$\int_0^2 \sqrt{x^4 + 4x^2 + 5} dx = \int_0^2 \sqrt{x^4 + 4x^2 + 5} dx$$

```
>integrate(mxm("sqrt(1+f(x))"),0,2)
```

6.99278252707

14. Tentukan suku ke-8 dari deret berikut

$$[3, 9, 27]$$

```
>n=8; a=3; r=3; a*r^(n-1)
```

6561

15. Hitunglah jumlah suku ke-6 dari deret no.14

```
>n=6; a=3; r=3; a*((r^n)-1)/(r-1)
```

1092

16. Hitunglah limit barisan dari

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{4n+1}{n}}$$

```
>$showev('limit((\sqrt{(4*n+1)/n}),n,inf))
```

$\infty = \infty$

17. Buatlah barisan kompleks dengan $X1=1$ dan $X2=3$

```
>sequence("x[n-1]+x[n-2]", [1,3],10)
```

[1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123]

18. Buatlah barisan ekspresi simbolik dengan maxima (bebas).

```
>deret &= makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,1,5); $deret
```

$$\left[x + 1, \frac{x^2}{2} + x + 1, \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1, \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1, \frac{x^5}{120} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 \right]$$